

1. Které aktivační metody pro EEG se již nepoužívají:

- a) hluboké dýchání
- b) fotostimulace
- c) aktivace spánkem po probdělé noci

d) aktivace bemegridem

2. U transsexuality zvažujeme diferenciálně diagnosticky možnost přítomnosti

a) schizofrenie

- b) poruch nálady
- c) neurotické poruchy
- d) poruchy osobnosti
- e) počínající demence

3. Mezi pozitivní příznaky schizofrenie patří

- a) Abulie
- b) Autismus
- c) Blud kontrolovanosti**
- d) Emoční otupělost

4. Krtavost se vyskytuje u dětí

- a) s nízkým intelektem
- b) s expanzivním procesem CNS
- c) zanedbaných
- d) neurotických**

5. Pro indukovanou psychózu (folie a deux) je typické

- a) je reverzibilní
- b) má známky psychogenní psychózy
- c) blud přechází z postiženého jedince na zdravého

d) platí vše uvedené

6. Rodinné patologie se nejúžeji dotýká

- a) Systematická a komunikativní psychoterapie**
- b) Humanitní psychoterapie
- c) Komunikačně modelová terapie
- d) Kognitivně behaviorální terapie

7. U funkčních gastrointestinálních poruch lze použít:

- a) levopromazin
- b) klozapin
- c) sulpirid**
- d) žádné z uvedených antipsychotik

8. Poruchy orientace jsou typické pro

- a) demenci
- b) delirium

c) mráкотný stav

d) platí vše uvedené

9. Nepříčetností pachatele se zabývá

- a) trestní řád
- b) trestní zákon**
- c) občanský zákoník
- d) vyhláška Ministerstva zdravotnictví

10. K symptomatickým psychózám patří

- a) Disociační amnézie
- b) Úzkostný raptus
- c) Porioomanie
- d) Horečnaté delirium**

11. Paměti se týkají tyto základní procesy:

- a) učení, zapamatování, zapomínání**
- b) učení a zapamatování
- c) zapamatování a zapomínání
- d) nic z uvedeného

12. Při schizofrenním stuporu je vědomí

- a) Zastřené
- b) Zmatené
- c) Nezměněné**
- d) Obluzené

13. K nežádoucím účinkům antipsychotik patří:

- a) ospalost a únava
- b) rozostřené vidění a sucho v ústech
- c) u dětí bolesti břicha
- d) platí vše uvedené**

14. V případě trestného činu spáchaného v epileptickém mráкотném stavu uzavíráme na

- a) vymizení rozpoznávacích a ovládacích schopností**
- b) snížení rozpoznávacích a ovládacích schopností
- c) zachování rozpoznávacích a ovládacích schopností
- d) jedná se o polehčující okolnost

15. O ukončení ochranného léčení rozhoduje

- a) ošetřující lékař se souhlasem svého nadřízeného
- b) ředitel ústavu vykonávajícího ochranné léčení
- c) soud na návrh ošetřujícího lékaře**
- d) ochranné léčení není možno ukončit
- e) žádná odpověď není správná

16. Mezi vyšší city řadíme

- a) emoční stlum
- b) emoční ambivalenci
- c) smysl pro krásno
- d) silné afekty

17. Nejnebezpečnější sexuální úchylkou je

- a) sadismus
- b) exhibicionismus
- c) porucha sexuální orientace
- d) pedofilie

18. Komplex méněcennosti hraje důležitou roli v koncepci

- a) A. Adlera
- b) E. Fromma
- c) S. Freuda
- d) H. S. Sullivana

19. Biologická zpětná vazba se užívá

- a) K odstranění funkčních poruch
- b) K monitorování fyziologických funkcí
- c) U relaxačních metod
- d) K získání potřebných informací o pacientovi

20. Stereotaktické mozkové operace v rámci ochranné léčby pachatelů závažných trestných činů lze provést

- a) na příkaz soudu
- b) z rozhodnutí lékaře provádějícího ochrannou léčbu
- c) při neúspěchu jiných léčebných a výchovných postupů
- d) pouze zcela výjimečně na žádost pachatele po schválení odbornou komisí

21. Sexuologický ústav Karlovy univerzity byl založen v roce

- a) 1782
- b) 1821
- c) 1921
- d) 1951
- e) 1989

22. Milnacipran působí:

- a) inhibicí monoaminoxidázy A typu
- b) inhibicí monoaminoxidázy B typu
- c) inhibicí zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu
- d) inhibicí zpětného vychytávání dopaminu

23. Mezi kvantitativní poruchy vědomí patří

- a) koma

- b) obnubilace
- c) delirium
- d) stav zmatenosti

24. Vtíravé myšlenky a nutkání vykřikovat nepatřičná slova v nevhodných situacích se nazývá

- a) kontrénní myšlenky
- b) autoakuzace
- c) dominantní myšlenky
- d) neologismy

25. Kryptomnézie je

- a) vzpomínkový klam
- b) hypomnézie
- c) ekmnézie

d) neúmýslný plagiát

26. Zvýšená úzkostnost a perfekcionismus, rizikové faktory pro vznik anorexia nervosa, jsou přičítány především

- a) serotoninu
- b) dopaminergnímu systému
- c) gabaergnímu systému
- d) opioidnímu systému

27. Při rozhovoru s pacientem je třeba

- a) Dát najevo, co si o pacientovi myslíme
- b) Udržet si zdravý odstup
- c) Dělat si poznámky

d) Dávat pacientovi najevo, že ho akceptujeme

28. Léčbu anorexia i bulimia nervosa komplikuje

- a) Komorbidní porucha osobnosti
- b) Sebeпоškozování
- c) Abusus návykových látek
- d) Diabes

e) Platí vše uvedené

29. Relaxační trénink vychází z ovlivnění faktorů

- a) Psychická tenze
- b) Funkční stav vegetativní nervové soustavy
- c) Napětí svalstva

d) Vzájemná souvislost mezi třemi faktory výše uvedenými

30. Zadržetí nemocného v ústavu zdravotnické péče bez jeho souhlasu je možné, když dotyčný

- a) trpí duševní poruchou či chorobou
- b) je nebezpečný sobě nebo svému okolí pro duševní chorobu či poruchu
- c) odmítne docházet na plánovanou psychiatrickou kontrolu

- d) platí vše uvedené
- e) neplatí nic z uvedeného

31. Transformace osobnosti znamená

- a) změnu celoživotního zaměření
- b) zlom životní linie
- c) rozpad osobnosti
- d) blud o změně v jinou osobnost**

32. K charakteristice disociačního záchvatu patří

- a) Vymizení reakce na osvit
- b) Výskyt v přítomnosti druhých lidí**
- c) pokousání jazyka
- d) aura

33. K disociačním poruchám řadíme

- a) emoční útlum
- b) inadekvátní odpovědi
- c) Ganserův syndrom**
- d) somnambulismus

34. Pro parafrenní formu paranoidní schizofrenie je typické

- a) Hypochondrické bludy
- b) Tělové halucinace**
- c) Zrakové halucinace
- d) Autismus

35. K tikovým projevům patří

- a) koprofalie
- b) palilalie
- c) platí vše uvedené**

36. Riziko pro děti schizofrenního rodiče je nejčastěji uváděno okolo:

- a) 12 - 13 %**
- b) 20 - 25 %
- c) 5 - 10 %
- d) 30 - 35 %

37. Generalizovaná úzkostná porucha vzniká nejčastěji na podkladě

- a) Chronického stresu**
- b) Opakovaných depresivních fází
- c) Emočně nestabilní osobnosti
- d) Platí vše uvedené

38. Eidetická vloha znamená

- a) sklon k filosofování

- b) sklon k pseudologia phantastica
- c) zvýšenou náchylnost k simulaci
- d) přetrvávající přesnou reprodukci vnímaného**

39. Injekci depotního neuroleptika flufenazin dekanóátu (Moditen depot) podáváme při udržovací léčbě jedenkrát za 2 až 4 týdny u pacientů s diagnózou:

- a) schizofrenie**
- b) mentální anorexie
- c) obsedantně kompulzivní poruchy
- d) demence

40. Zabije-li matka své dítě během porodu nebo krátce po něm, považuje se tato skutečnost obvykle za

- a) polehčující okolnost**
- b) přitěžující okolnost
- c) projev poruchy osobnosti
- d) uvedená skutečnost nemá forenzní význam

41. Pro alkoholovou halucinózu je typické

- a) Vznik v důsledku jednorázové těžké ebriety
- b) Přítomnost antagonistických halucinací**
- c) Nadměrná spavost
- d) Přítomnost amnestického syndromu

42. Antidepresiva se v dorostové psychiatrii podávají:

- a) pokud není účinek psychoterapie dostačující
- b) vždy, pokud hrozí sebevražedný pokus
- c) platí obě výše uvedené možnosti**
- d) nikdy

43. Které skupiny psychofarmak nesmíme vzájemně kombinovat?

- a) antipsychotika a antidepresiva
- b) selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a inhibitory monoaminoxidázy A typu**
- c) selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a benzodiazepinová anxiolytika
- d) tricyklická antidepresiva (thymoleptika 1. generace) a hypnotika

44. U kriminálních recidivistů často zjišťujeme

- a) poruchy osobnosti
- b) lehce snížený intelekt
- c) zneužívání alkoholu
- d) platí vše uvedené**
- e) neplatí nic z uvedeného

45. Elektivní mutismus se nazývá

- a) aphrasia voluntaria**
- b) afonie

- c) afázie
- d) neplatí nic z uvedeného

46. Pro diagnostikování schizofrenie musí její příznaky trvat alespoň

- a) Jeden týden
- b) Jeden měsíc**
- c) Tři měsíce
- d) Časový faktor není důležitý

47. Placebo efekt je

- a) Snadný účinek léku
- b) Účinek léku na několik orgánů současně
- c) Sugestivní účinek léku**
- d) Účinek bez efektu

48. Dítěti se má sdělit, že je adoptováno, ve věku

- a) 3-5 let**
- b) 6-12 let
- c) 16-18 let
- d) je lépe údaje o adopci zatajit

49. Sebevražda u dospívajících jedinců je

- a) Nejčastější příčina smrti
- b) Druhá nejčastější příčina smrti**
- c) Vzácná příčina smrti
- d) Nevyskytuje se

50. Pacient starý 41 let, nekvalifikovaný dělník, rozvedený, žijící ve společné ubytovně. Je znám svou nespolehlivostí, agresivitou, konzumací alkoholu. V ebrietě utrpěl pád s následnou frakturou paže, přijat na lůžkové chirurgické oddělení. Třetí den po přijetí se změnilo jeho chování – byl roztěkaný, objevila se u něj zvýšená úzkost. V noci se mu začaly třást prsty rukou, vstával z lůžka, ač neměl, hovořil sám pro sebe, rukou dělal pohyby jako když odhání hmyz. Nejpravděpodobnější diagnóza je:

- a) Paranoidní schizofrenie
- b) Manická epizoda
- c) Porucha přizpůsobení
- d) Delirium tremens**

51. K manické náladě patří

- a) bezradnost
- b) euforie**
- c) manýrování
- d) nic z uvedeného

52. Hyperkinetické poruchy se nejčastěji projevují

- a) v prvních 5 letech života**

- b) ve věku 5-10 let
- c) v adolescenci
- d) v dospělosti
- e) bez závislosti na věku

53. Co odlišuje učení A. Adlera od S. Freuda ve vztahu k cílové orientaci lidského života

- a) Potřeba začlenit, uplatnit a prosadit se ve společnosti**
- b) Preference sebezáchovného pudu před pudem sexuální
- c) Společenské postoje mění vztah k sexu
- d) Rozdílný důraz na důležitost raného vývoje jedince v dospívání

54. Kognitivně- behaviorální terapie se využívá při

- a) Obnově sebepřijetí a zmírnění vnitřních rozporů v osobnosti
- b) Odstranění zdravotních obtíží a nežádoucího chování vytvořením vhodných strategií pro řešení problémových situací, kontrolu a řízení vlastního chování**
- c) Nalezení, zpracování a tím i vyřešení ústředního konfliktu pacienta
- d) Snaze dosáhnout snížení nepříjemnosti situace opakovanou expozicí pacienta v situaci pro něho neuvěřitelnou

55. Forenzní psychiatrie je relativně samostatný vědní obor zabývající se aplikací psychiatrie na oblast

- a) trestněprávní
- b) občanskoprávní
- c) léčby duševně nemocných delikventů
- d) platí vše uvedené**

56. Mezi poruchy pohlavního života (sexuální dysfunkce) nepatří

- a) selhání genitální odpovědi
- b) ejaculatio praecox
- c) anorgasmie
- d) felatio**

57. U psychotické manie se mohou vyskytnout

- a) Tachypsychie
- b) Logoroe
- c) Megalomanické bludy
- d) Platí vše uvedené**

58. Stres vyvolává zvýšenou konzumaci

- a) tuků a cukrů**
- b) nekalorické stravy
- c) bílkovin
- d) neovlivňuje skladbu potravy u zvířat ani u lidí

59. Za kritéria normality v sexuální oblasti považujeme

- a) adekvátní pohlavní identitu

- b) přiměřený věk preferovaného objektu
- c) vzájemnou dobrovolnost
- d) přiměřenou techniku
- e) platí vše uvedené**

60. Základní rytmus EEG se vyznačuje:

- a) výrazným podílem genetických faktorů**
- b) genetické faktory mají zanedbatelný význam
- c) výrazný podíl genetických faktorů je zřejmý pouze u některých duševních poruch
- d) neplatí nic z uvedeného

61. Náhled pacienta je tvořen

- a) Náhledem choroby
- b) Náhledem nutnosti a vhodnosti léčby
- c) Náhledem potřebných změn v životním stylu
- d) Platí vše uvedené**

62. Impulzivní nemotivované vraždy se dopustí nejpravděpodobněji

- a) člověk s neurotickými obtížemi
- b) jedinec trpící schizofrenií**
- c) jedinec trpící afektivní poruchou
- d) platí vše uvedené

63. Jako antidepresivum rostlinného původu je používán extrakt z jedné z následujících bylin:

- a) třezalky tečkované**
- b) máty peprné
- c) kozlíku lékařského
- d) jinanu dvojlaločného (ginkgo biloba)

64. Negativní schizofrenní příznaky jsou typické pro schizofrenii

- a) Simplexní**
- b) Katatonní
- c) Paranoidní
- d) Hebefrenní

65. Behaviorální terapie se používá v léčbě

- a) Obsedantně-kompulzivní poruchy
- b) Depresivní epizody
- c) Neurotických příznaků**
- d) Platí vše uvedené

66. Mezi reverzibilní inhibitory monoaminoxidázy A typu náležejí:

- a) moclobemid**
- b) nialamid
- c) fluvoxamin
- d) dosulepin

67. Profesor Vondráček je považován za zakladatele české

- a) sociální psychiatrie
- b) matrimoniologie
- c) lékařské psychologie**
- d) psychoterapeutické školy

68. Katatymní myšlení je významně určováno

- a) vědomím
- b) emocemi**
- c) intelektem
- d) vůlí

69. Průměrné trvání anorexia nervosa

- a) 6 let**
- b) 1 rok
- c) Celoživotní chronické onemocnění, nelze stanovit
- d) 15-20 let

70. Hypoprosexie znamená sníženou

- a) pozornost**
- b) paměť
- c) sexuální aktivitu
- d) emoční odpověď

71. Elektivní mutismus se vyskytuje zejména u dětí

- a) mentálně retardovaných
- b) nemocných maniodepresivní psychózou
- c) úzkostných, odtažitých, s poruchami osobnosti**
- d) výchovně zanedbaných

72. Pokud je pachatel trestného činu pro přítomnost duševní poruchy v době páchaní trestné činnosti shledán nepřičetným, je obvykle doporučováno

- a) uložení ochranné léčby**
- b) zkrácení trestu odnětí svobody
- c) odložení výkonu trestu po vyléčení
- d) neplatí nic z uvedeného

73. Hypobulie znamená

- a) sníženou chuť k jídlu
- b) opak bulimie
- c) poruchu sexuálního pudu
- d) snížení volní aktivity**

74. Ejaculatio ante portas je

- a) zvláštní druh parafílie

b) intenzivní forma ejaculatio praecox

- c) situačně podmíněné ejaculatio praecox
- d) neplatí nic z uvedeného

75. Rozšířené sebevraždy se nejčastěji dopustí osoba trpící

- a) schizofrenií
- b) melancholií**
- c) poruchou osobnosti
- d) demencí

76. Ženy se dopouštějí nejčastěji trestné činnosti v období

- a) premenstruačním**
- b) v období menstruace
- c) po skončení menstruace
- d) periovulačně

77. U předem připravovaných majetkových trestných činů bývají rozpoznávací a ovládací schopnosti osob s lehkou mentální retardací hodnoceny jako

- a) zachovalé**
- b) snížené
- c) vymizelé
- d) nedá se jednoznačně říci

78. Hlavní oblast léčby depotními antipsychotiky je:

- a) profylaktická léčba maniodepresivní psychózy
- b) léčba manie
- c) udržovací léčba schizofrenie**
- d) léčba panických atak

79. Levopromazin je užíván také:

- a) k léčbě u farmakoresistentní poruchy spánku
- b) v kombinaci s opiáty u těžkých algických stavů
- c) žádné z uvedených tvrzení
- d) první a druhé tvrzení je správné**

80. Mezi příznaky Kannerova autismu patří

- a) opoždění řeči
- b) snížená potřeba emočního kontaktu
- c) úzkost při poruchách stereotypu okolí
- d) platí vše uvedené**

81. Tricyklická antidepresiva mohou působit:

- a) zhoršení akomodace oka
- b) kardiotonické efekty
- c) zácpu
- d) vše z uvedeného**

82. Blokáda D2 dopaminových receptorů způsobuje:

- a) antipsychotický účinek
- b) zvýšenou sekreci prolaktinu
- c) extrapyramidové účinky
- d) všechny uvedené účinky**

83. Školní neprospěch je důsledkem

- a) neurotických obtíží
- b) začínajícího psychotického onemocnění
- c) rodinného rozvratu
- d) platí vše uvedené**

84. Nejčastější syndrom při psychických poruchách v dětství je

- a) paranoidně-halucinatorní
- b) depresivní
- c) anxiózně-obsedantní
- d) hyperkinetický**

85. Venlafaxin působí mechanismem:

- a) Inhibicí monoaminoxidázy A typu
- b) Selektivní inhibicí zpětného vychytávání serotoninu
- c) Selektivní inhibicí zpětného vychytávání noradrenalinu
- d) Selektivní inhibicí zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu**

86. Během rozhovoru je nejdůležitější

- a) Udržet dobrý kontakt**
- b) Dělat si poznámky
- c) Příliš nespěchat
- d) Neplatí nic z uvedeného

87. Philippe Pinel se zasloužil o rozvoj psychiatrie

- a) výrazným zhumanizováním péče o duševně nemocné**
- b) zavedením psychofarmak
- c) popisem schizofrenie
- d) platí vše uvedené

88. Které z uvedených antidepresiv nejvíce zlepšuje spánek?

- a) mirtazapin**
- b) venlafaxin
- c) fluoxetin
- d) moclobemid

89. K běžným projevům dospívání nepatří

- a) emoční výkyvy
- b) filozofování

- c) rozvoj abstraktního myšlení
- d) závislost na návykových látkách**

90. Pro škodlivé užívání kanabinoidů je typické

- a) Chronické záněty dýchacích cest**
- b) Předčasný rozvoj aterosklerózy
- c) Jaterní cirhóza
- d) Platí vše uvedené

91. Antiagresivní účinek nevykazují:

- a) lithium
- b) antipsychotika
- c) nootropika**
- d) karbamazepin

92. Odvykací stav při závislosti na opioidech je charakterizován

- a) Bolestivými křečemi
- b) Slzením
- c) Rýmou
- d) Platí vše uvedené**

93. Chorobný strach ze špíny se nazývá

- a) sitofobie
- b) hypsofobie
- c) aichmofobie
- d) mysofobie**

94. Uložením ochranného léčení se zabývá

- a) trestní zákon**
- b) trestní řád
- c) občanský zákoník
- d) vyhláška Ministerstva zdravotnictví

95. Mezi klinické obrazy obnubilace patří

- a) Ganserův syndrom
- b) forma vigilambulantní
- c) forma deliriózní
- d) platí vše uvedené**

96. Enkopréza může být způsobena

- a) gastrointestinální infekcí
- b) zácpou
- c) nepřiměřenou výchovou k čistotě**
- d) čímkoli z uvedeného
- e) ničím z uvedeného

97. Pro manifestaci schizofrenie je kritický věk

- a) 35 roků a výše
- b) 16 - 25 let**
- c) 26-35 let
- d) platí vše uvedené

98. Pocit změněného prožívání okolí se nazývá

- a) pseudoiluze
- b) derealizace**
- c) iluze
- d) pseudohalucinace

99. Psychostimulační účinky z uvedených látek má:

- a) kys. acetylsalicylová
- b) indomethacin
- c) efedrin**
- d) neplatí nic z uvedeného

100. Zkratkové jednání je charakterizováno

- a) chyběním cíle
- b) ztrátou vzpomínky
- c) zjevnou motivací**
- d) platí vše uvedené

101. Normální dětský záznam se podobá dospělému záznamu včetně výskytu alfa aktivity.

- a) v 6 letech
- b) ve 13 letech
- c) v 18 letech**

102. Diagnóza neurotické poruchy u pachatele trestného činu má obvykle za následek

- a) vyslovení vymizení rozpoznávacích a ovládacích schopností
- b) vyslovení podstatného snížení rozpoznávacích a ovládacích schopností
- c) považuje se za polehčující okolnost
- d) neplatí nic z uvedeného**

103. Prevence relapsu zahrnuje

- a) Identifikaci situací a konfliktů, které představují riziko pro daného jedince
- b) Další sledování po intenzivní léčbě
- c) Podporu pečujících rodinných příslušníků
- d) Psychoedukaci a destigmatizaci problému v populaci
- e) Platí vše uvedené**

104. Které z níže uvedených faktorů mohou přispět k rozvoji sexuální dysfunkce

- a) nevědomé pocity viny týkající se sexu
- b) pohlavní zneužití v dětství
- c) neschopnost partnerů diskutovat své sexuální pocity a způsob sexuálního chování, který preferují

d) strach z nedostatečné výkonnosti

e) vše z uvedeného

105. Vyhrožování sebevražedným jednáním v dospívání

a) je demonstrativního charakteru a není třeba se jím zabývat

b) většinou nebývá realizováno

c) není častou příčinou smrti v dětství a dospívání

d) je voláním o pomoc a příznakem selhání prostředí dítěte

106. Mezi 4 základní Bleulerovy příznaky schizofrenie nepatří

a) Asociativní poruchy myšlení

b) Apresexie

c) Ambivalence

d) Autismus

107. Fotomy patří k

a) disociativním poruchám

b) elementárním halucinacím

c) poruchám vizu

d) bludům

e) iluzím

108. Před nasazením lithia je nutno vyšetřit:

a) funkce renální, kardiální a tyreoidální

b) stanovení elektrolytů urey, kreatininu, TSH

c) u žen v produktivním věku těhotenský test.

d) platí vše uvedené

109. Psychogymnastika je

a) Metoda k rozvoji výkonnosti psychiky

b) Diagnostická metoda k rozlišení somatických a psychických poruch

c) Modelové zpracování prožitých i budoucích situací pohybem

d) Modelové zpracování prožitých i budoucích situací pohybem a slovem

110. Nozoagnózie znamená

a) nepřítomnost nemoci

b) chybění náhledu na onemocnění

c) poruchu gnostických funkcí

d) nic z uvedeného

111. Zmenšená přičetnost

a) znamená, že schopnost pachatele rozpoznat nebezpečnost svého jednání a toto ovládat byla vlivem duševní poruchy snížena

b) odůvodňuje možnost zvláštního postupu vůči pachateli

c) umožňuje uložení ochranného léčení

d) platí vše uvedené

e) neplatí nic z uvedeného

112. Příkladá-li jedinec trpící psychotickou poruchou běžným jevům tajemný význam, jedná se o myšlení

a) autistické

b) magické

c) zmatené

d) dereistické

113. Pro diagnózu Alzheimerovy demence je cenné zjištění

a) Schodovitého průběhu

b) Ložiskových neurologických příznaků

c) Plynulé progresse choroby

d) Afektivní lability

114. K akutním příznakům intoxikace kokainem nepatří

a) Agresivita

b) Mióza

c) Pocení

d) Psychomotorický neklid

115. První česká psychiatrická klinika vznikla v roce

a) 1790

b) 1886

c) 1918

d) 1920

116. Moral insanity znamená poruchu

a) vědomí

b) vyšších citů

c) intelektu

d) vnímání

117. Dlouhodobá paměť je definována retencí informace po dobu:

a) alespoň několika minut

b) několika desítek minut

c) několika hodin

d) několika dní

118. Pacienti jsou aktivními členy, kteří se podílejí na léčbě s terapeutů v

a) Hypnoterapii

b) Terapeutické komunitě

c) Psychoanalýze

d) Nereflexním systémem

119. Do syndromu závislosti nepatří

- a) Craving
- b) Snížená tolerance**
- c) Snížená kontrola užívání látky
- d) Opouštění dřívějších zájmů a zálib

120. Jestliže dítě koktá, je vhodné začít léčbu

- a) ve věku 8-10 let
- b) ještě před nástupem školy**
- c) neléčit vůbec, čekat, až z toho dítě vyroste
- d) v období dospívání

121. K léčbě depresivního syndromu v dětství a dospívání se nejčastěji užívá

- a) chlorpromazin
- b) fluoxetin
- c) sertralin**
- d) olanzapin

122. Rozhovor s pacientem

- a) Je důležitý pro stanovení diagnózy
- b) Slouží k získání objektivních údajů
- c) Pacienta povzbuzuje
- d) Platí vše uvedené**

123. Generalizovaná úzkostná porucha je charakterizovaná

- a) Nepřítomností panických atak
- b) Chronickou úzkostnou symptomatikou
- c) Nepříjemnými somatickými příznaky
- d) Platí vše uvedené**

124. Děti při rozvodu rodičů nejčastěji reagují

- a) depresivními a agresivními reakcemi**
- b) rozvodovou situaci si příliš neuvědomují, snadno si zvyknou
- c) obsedantními projevy
- d) poruchou vztahu k sourozenci

125. Chorobné přesvědčení o znetvořeném či odpudivém zevnějšku je blud

- a) negační
- b) autoakuační
- c) dysmorfický**
- d) persekuční

126. Mezi zakladatele sexuologie patří

- a) A. Forel
- b) H. Havelock Ellis
- c) R. von Krafft-Ebing
- d) všichni uvedení**

- e) nikdo z uvedených

127. Pro akutní intoxikaci opioidy svědčí

- a) Míóza
- b) Somnolence
- c) Setřelá řeč
- d) Platí vše uvedené**

128. Trvalou poruchu s bludy odlišují od schizofrenie

- a) Inventorní blud
- b) Žárlivecký blud
- c) Nepřítomnost halucinací
- d) Úzkostně depresivní nálada**

129. Agrypnie je jiný název pro

- a) chrápání
- b) spánkovou obrnu
- c) hypersomnii
- d) somnambulismus
- e) insomnii**

130. Pro nutkavé jevy je typické

- a) nevhodnost až absurdnost
- b) náhled chorobnosti
- c) nemožnost je volně potlačit
- d) platí vše uvedené**
- e) neplatí nic z uvedeného

131. Je-li pacient nevývratně přesvědčen, že trpí rakovinou, ač pro toto onemocnění nic nesvědčí, jde o

- a) kancerofobii
- b) nozofobii
- c) halucinaci
- d) hypochondrický blud**
- e) negační blud

132. Lékem první volby u poruchy aktivity a pozornosti a hyperkinetické poruchy chování (syndromu ADHD – Attention deficit/hyperactivity disorder) jsou

- a) psychostimulancia**
- b) sedativa
- c) hypnotika
- d) antiepileptika

133. Nejintenzivnější negativní vedlejší účinky na pohlavní život má

- a) trazodon
- b) nortriptylin

- c) fluoxetin
- d) lithium
- e) moklobemid

134. Grimasování je typické pro schizofrenii

- a) Paranoidní
- b) Hebefrenní**
- c) Katatonní stuporózní
- d) Simplexní

135. Které z uvedených antidepresiv ovlivňuje také dopaminergní systém?

- a) fluvoxamin
- b) venlafaxin
- c) trazodon
- d) bupropion**

136. Hyperkinetické děti mají obvykle

- a) nízký inteligenční kvocient
- b) poruchy pozornosti**
- c) hrubé poruchy EEG epileptického charakteru
- d) poruchy růstu dlouhých kostí

137. K somatoformním poruchám patří

- a) Somatoformní vegetativní dysfunkce
- b) Hypochondrická porucha
- c) Somatizační porucha
- d) Platí vše uvedené**

138. V populaci kriminálních recidivistů se nejčastěji setkáme s osobami trpícími

- a) schizofrenií
- b) afektivní poruchou
- c) poruchou osobnosti**
- d) demencí

139. Stimulancia riziko závislosti u dětí s poruchou pozornosti s hyperaktivitou a impulzivitou (ADHD):

- a) zvyšují
- b) neovlivňují
- c) snižují**
- d) zvyšují a proto se u dětí s ADHD nepodávají

140. Vyšetření duševního stavu pachatele trestného činu provádějí

- a) jeden soudní znalec z oboru psychiatrie, event. s dalšími konzultanty**
- b) jeden soudní znalec z oboru klinická psychologie
- c) jeden soudní znalec z oboru psychiatrie a 1 soudní znalec z oboru klinická psychologie
- d) provádí se dle uvážení orgánů činných v trestním řízení

- e) žádná odpověď není správná

141. Důvodem přijetí dospívajících na záchytnou stanici je nejčastěji

- a) počínající závislost na alkoholu
- b) osamělé pijáctví
- c) fetální alkoholický syndrom
- d) neplatí nic z uvedeného**

142. Pro vaskulární demenci je typické

- a) Afektivní labilita**
- b) Vyhasnutí emočních reakcí
- c) Rozpad osobnosti
- d) Zvýšené sebevědomí

143. V kriminální populaci zjišťujeme přítomnost schizofrenie

- a) takřka nikdy
- b) u několika procent pachatelů**
- c) u několika desítek procent pachatelů
- d) ve více než polovině případů

144. Terapeutická a profylaktická hladina lithia je udržovaná v rozmezí:

- a) 0,2 - 0,4 mmol/l
- b) 0,6 - 0,8 mmol/l**
- c) 1 - 3 mmol/l
- d) stanovení hladiny lithia není z klinického hlediska významné

145. Emoční ambivalence je typická pro

- a) manický syndrom
- b) periodickou depresivní poruchu
- c) schizofrenii**
- d) m. Alzheimer
- e) vaskulární demenci

146. K antipsychotikům 2. generace nepatří:

- a) pimozid**
- b) sulpirid
- c) risperidon
- d) ziprasidon

147. Bazální ganglia představují tyto základní struktury:

- a) nucleus caudatus a putamen
- b) putamen a globus pallidus
- c) nucleus caudatus, putamen a globus pallidus**
- d) neplatí nic z uvedeného

148. Pro mentální retardaci svědčí IQ

- a) pod 30
- b) pod 60
- c) pod 70
- d) vše uvedené**

149. Při předávkování antidepresiv typu SSRI hrozí:

- a) maligní neuroleptický syndrom
- b) epileptické záchvaty
- c) serotoninový syndrom**
- d) toxická psychóza

150. První český profesor psychiatrie byl

- a) K. Kuffner
- b) B. Čumpelík**
- c) A. Heveroch
- d) Z. Mysliveček

151. Pro demenci při Parkinsonově chorobě je typické

- a) Fatické poruchy
- b) Apraxie
- c) Zpomalené tempo**
- d) Stavby zmatenosti

152. Klaustrofobie je strach z

- a) volného prostřanství
- b) nemoci
- c) uvěznění
- d) uzavřeného prostoru**

153. Inhibitory acetylcholinesteráz mohou způsobit:

- a) zrychlení tepové frekvence
- b) zpomalení tepové frekvence**
- c) zvýšení krevního tlaku
- d) vše z uvedeného

154. Abulie označuje

- a) nechutenství
- b) plané vtipkování
- c) vymizení volní aktivity**
- d) tupou spokojenost

155. Zvýšená aktivita až agitovanost se vyskytuje u

- a) Hypománie
- b) Hypertyreózy
- c) Mentální anorexie
- d) Platí vše uvedené**

156. Pro syndrom demence je typické

- a) raptus
- b) hyperagilnost
- c) obnubilace
- d) změna osobnosti**

157. Poruchy usínání jsou nejčastější u

- a) obsedantně kompulzivní poruchy
- b) panické poruchy
- c) prodloužené depresivní reakce**
- d) fobické úzkostné poruchy

158. Sebepoškození se vyskytuje

- a) u mentálně retardovaných dětí
- b) v partách dospívajících jako výraz příslušnosti ke skupině
- c) u dětí s psychopatickým vývojem osobnosti
- d) platí vše uvedené**

159. Mezi kvality pozornosti nepatří

- a) vigilita
- b) tenacita
- c) selektivita
- d) indukce**

160. Způsobilé osoby k právním úkonům jsou podle občanského zákoníku jedinci

- a) starší 15 let
- b) starší 18 let**
- c) starší 21 let
- d) všichni duševně zdraví občané našeho státu
- e) žádná odpověď není správná

161. Empatií rozumíme

- a) Terapeutovo porozumění psychickým pocitům a prožitkům**
- b) Ocenění produktivních osobnostních vlastností terapeutem
- c) Společné osobnostní vlastnosti pacienta a terapeuta
- d) Platí vše uvedené

162. Rozšířenou sebevraždu zdůvodňuje depresivní pacient

- a) Odplatou za utrpené příkoří
- b) Pocitem neklidu
- c) Pocitem vlastního provinění
- d) Vysvobozením oběti z hrozného osudu**

163. Přesunutí afektu znamená

- a) iradiaci afektu

- b) změnu afektu do opačného pólu
- c) změnu v patický afekt
- d) vybití emočního napětí v jiné situaci, než při které vzniklo**

164. Obranné mechanismy jsou

- a) Potlačení a přesun
- b) Izolace
- c) Projekce
- d) Platí vše uvedené**

165. Nejméně nežádoucích účinků mezi antipsychotiky vykazuje:

- a) klozapin
- b) aripiprazol**
- c) haloperidol
- d) žádné z uvedených farmak

166. Psychoterapie psychóz se zřetelem ke schizofrenním onemocněním spočívá v

- a) Dosažení větší vnitřní stability
- b) Poskytnutí emoční podpory prostřednictvím psychotherapeutického vztahu a následném zpracování psychotické zkušenosti**
- c) Přijatelném vysvětlení halucinatorních zážitků
- d) Náviku nových vzorců chování s předchozím vysvětlením teoretických podkladů a principu choroby

167. Inhibitor glutamátergních receptorů typu NMDA (N-metyl-D-aspartátových) v mozku je:

- a) rivastigmin
- b) memantin**
- c) piracetam
- d) extractum ginkgo biloba

168. Žena stará 35 let, vdaná, matka 2 dětí, středoškolačka. Vždy měla sklon k sebezpodceňování, trémě, pesimizmu. Je stále vyladěna směrem ke smutku – bez příčiny, málomluvná. Obtížně navazuje kontakty. Před dvěma lety se léčila pro depresi. Přivedena manželem – odmítla nabízenou výhodnější pozici v práci s tím, že by to nezvládla. Somaticky je zdravá. Pravděpodobná diagnóza je:

- a) Generalizovaná úzkostná porucha
- b) Simplexní schizofrenie
- c) Dysthymie**
- d) Vyhýbavá osobnost

169. Depravace osobnosti je postižení především v oblasti

- a) intelektu
- b) paměti
- c) sociálních vztahů**
- d) myšlení
- e) pozornosti

170. U sexuálních úchylek bývá narušena

- a) sexuální identifikace
- b) sexuální orientace
- c) sexuální jednání
- d) platí vše uvedené**
- e) neplatí nic z uvedeného

171. Psychodrama je

- a) Divadelní hra s psychickou zápletkou
- b) Ztvárnění psychiku zraňujících zážitků
- c) Improvizované zjednodušené divadlo k terapeutickým účelům**
- d) Divadelní tragédie

172. Noční pomočování považujeme za poruchu od

- a) 1 a půl roku dítěte
- b) 4 let dítěte**
- c) 8 let dítěte
- d) dospívání

173. Psychóza je definována jako duševní porucha

- a) ovlivňující jednání nemocného
- b) zasahující jádro osobnosti nemocného
- c) vznikající endogenně, somatogenně nebo psychogenně
- d) platí vše uvedené**

174. Emoční inkontinence je typická pro

- a) bipolární afektivní poruchu
- b) depresivní fázi
- c) schizoafektivní poruchu
- d) vaskulární demenci**

175. Halucinace nejsou typické pro

- a) manický syndrom**
- b) schizofrenii
- c) toxickou psychózu
- d) delirium

176. Ochranné léčení duševní nemocného pachatele trestného činu trvá

- a) minimálně 1 rok
- b) až do smrti pachatele
- c) až do pozitivního ovlivnění duševní poruchy pachatele, která podmiňovala jeho nebezpečnost**
- d) maximálně 1 rok
- e) žádná odpověď není správná

177. Vedle lithia lze profylaxi maniodepresivního onemocnění užít také:

- a) amitriptylin
- b) diazepam

- c) valproát sodný
- d) haloperidol

178. Mezi somatické následky poruch příjmu potravy patří

- a) Srdeční arytmie a hypotenze
- b) Kolapsové stavy
- c) Hypothyreóza
- d) Atrofie mozku
- e) Platí vše uvedené

179. Slyší-li pacient hlasy, které si navzájem odporují, jde o halucinace

- a) intrapsychické
- b) antagonistické
- c) extrakampinní
- d) asociované

180. Sklon k perfekcionismu je typický pro specifickou poruchu osobnosti

- a) Anankastickou
- b) Závislou
- c) Anxiózní
- d) Emočně nestabilní

181. Do syndromu závislosti nepatří

- a) Výskyt patické opilosti
- b) Somatický odvykací stav
- c) Silná touha užívat látku
- d) Postupné zanedbávání zájmů ve prospěch užívání látky

182. Psychický stav dětí po rozvodu rodičů záleží nejvíce na

- a) výši finančního příspěvku
- b) častosti styků s odcházejícím rodičem
- c) vzájemné spolupráci rodičů po rozvodu
- d) vždy dochází k psychickým poruchám, jejich vznik nelze nijak ovlivnit

183. Během rozhovoru s pacientem je žádoucí, aby se psychiatr choval

- a) Pokud možno neutrálně
- b) Přátelsky a srdečně
- c) Kamarádsky
- d) Tak, aby získal a udržel důvěru pacienta

184. Ke stanovení IQ se užívá testu

- a) Wartegova
- b) Wassermannova
- c) Wechslerova
- d) Widmarkova

185. Mezi trvalé poruchy nálad nepatří

- a) Dystymie
- b) Cyklotymie
- c) Jiná trvalá porucha nálady
- d) Rekurentní depresivní porucha v remisi

186. Motivaci k léčbě u pacientky nevyššíme

- a) Expertní konfrontací s tělesnými následky onemocnění
- b) Přijetím pacienta a jeho chápáním nemoci
- c) Motivačním rozhovorem
- d) Zdůrazněním pacientovi odpovědnosti a svobodné volby

187. V průběhu demence vzniká deficit:

- a) v systému cholinergním
- b) v systému noradrenergním
- c) v systému dopaminergním
- d) ve všech uvedených systémech, zejm. v cholinergním

188. Nová koncepce psychiatrie preferuje při vzniku duševních poruch

- a) biologické faktory
- b) psychologické faktory
- c) sociální faktory
- d) integraci biologických, psychologických a sociálních funkcí
- e) výlučně aplikaci patofyziologických koncepcí vyšší nervové činnosti

189. Averzivní terapie spočívá v

- a) hostilitě vůči terapeutovi
- b) léčení pocitu viny
- c) spojování nežádoucí aktivity s psychoterapeutickým pohovorem
- d) spojování nežádoucí aktivity s nepříjemným podnětem

190. Pro fanatismus je typická přítomnost

- a) megalomaniického bludu
- b) dominantní představy
- c) ovládací představy
- d) obsedantní myšlenky

191. Jednotlivé diagnózy spektra poruch příjmu potravy

- a) mohou přecházet jedna v druhou
- b) mohou být úspěšně léčeny se vznikem celoživotní remise, nebo parciální remise
- c) mají různě zvýšenou mortalitu
- d) se liší procenty úspěšnosti léčby a procenty relapsů
- e) platí vše uvedené

192. Odvykací stav u závislosti na heroinu může být vyprovokován podáním

- a) morfinu

- b) naloxonu
- c) metamfetaminu
- d) methadonu

193. K manickému syndromu patří nálada

- a) Rezonantní
- b) Depresivní
- c) Úzkostná
- d) Apatická

194. V léčbě ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou a impulzivitou - attention deficit/hyperkinetic disorder) a poruch chování u dětí jsou neúčinná:

- a) stimulancia
- b) antidepresiva
- c) antipsychotika
- d) nootropika

195. Anorexia nervosa je charakterizována

- a) BMI pod 17,5
- b) BMI pod 15,0
- c) BMI v rozmezí 15 až 17,5
- d) BMI pod 19,0

196. Volné asociace učinil poprvé základní psychoterapeutickou technikou

- a) J. M. Charcot
- b) S. Freud
- c) P. Janet
- d) V. E. Frankl

197. Při vzniku hyperkinetické poruchy v dětství se vedle faktorů genetických mohou uplatnit:

- a) nízká porodní váha
- b) abusus alkoholu u matky
- c) nadměrné kouření u matky
- d) platí vše uvedené

198. Alkoholická halucinóza bývá charakterizována náladou

- a) Expanzivní
- b) Úzkostnou
- c) Manickou
- d) Rezonantní

199. Nutkavé jednání je typické pro

- a) melancholii
- b) histrionskou poruchu osobnosti
- c) trvalou poruchu s bludy
- d) obsedantně kompulzivní poruchu

200. Pacienti se závislostí na alkoholu mají ve srovnání s celkovou populací sexuálních dysfunkcí

- a) více
- b) méně
- c) stejně
- d) nedá se jednoznačně určit
- e) závisí na množství požívaného alkoholu

201. Mentální retardaci charakterizuje

- a) Přechodné snížení intelektu
- b) Sociální zanedbanost
- c) Vrozený nebo do dvou let získaný defekt intelektu
- d) Postupný úbytek intelektu

202. U deliria bývá myšlení

- a) autistické
- b) zmatené
- c) magické
- d) obsedantní

203. Jaký je praktický přínos C. G. Junga

- a) Typologie sangvinik x pyknik
- b) Typ vyrovnaný x nevyrovnaný
- c) Neurotické potíže mají kořeny v negativním přístupu rodiče k dítěti
- d) Typologie extravert x introvert

204. Pro delirium jsou typické

- a) persekční bludy
- b) zrakové iluze
- c) suicidální úmysly
- d) manická nálada

205. K poruchám jednání patří

- a) echopraxie
- b) stupor
- c) impulzivní jednání
- d) platí vše uvedené

206. Mezi projevy manického syndromu nepatří

- a) povznesená nálada
- b) neklid
- c) porucha vědomí
- d) insomnie
- e) agresivita

207. K častým nežádoucím účinkům tricyklických antidepresiv náleží:

- a) nežádoucí zvýšení sexuální apetence
- b) halucinace
- c) sucho v ústech**
- d) gastritidy

208. O prostudování vztahu somatického typu a charakteru duševní poruchy se významně zasloužil

- a) P. Pinel
- b) I.P. Pavlov
- c) E. Kretschmer**
- d) E. Kraepelin

209. Pro vývoj mentálně retardovaného dítěte je nejlepší

- a) když je hned po narození umístěno v ústavu
- b) když je po celý život vychovááno pouze v rodině
- c) když je ve vlastní rodině a může navštěvovat zařízení se zdravými dětmi**
- d) když je vychovááno v rodině a stýká se pouze s retardovanými dětmi

210. Nadměrná přítulnost ve věku 2-5 let je příznakem

- a) sociální zralosti
- b) snížení intelektu
- c) ústavní výchovy**
- d) dobrých rodinných vztahů

211. EEG zobrazený signál na obrazovce je při skalpovém položení elektrod tvořen:

- a) neuronovým elektrickým potenciálem
- b) gliálním elektrickým potenciálem
- c) součtem neuronového, gliálního a muskulárního potenciálu**

212. Když se s pacientem po prvé setkáváme, podáme mu ruku

- a) Ze zdvořilosti a úcty
- b) Na uvítanou
- c) Abychom dali najevo svoji sympatii
- d) Platí vše uvedené**

213. Mezi hypnosuggestivní metody patří

- a) skupinová hypnóza
- b) hypnokatarze
- c) autohypnoza
- d) platí vše uvedené**

214. Syndrom demence připomínají psychopatologické symptomy při

- a) Hyperfunkci příštítných tělísek
- b) Basedowově chorobě
- c) Myxedému**
- d) Diabetes mellitus II. typu

215. U deliria tremens se pravidelně vyskytuje

- a) Profúzní pocení**
- b) Průjmy
- c) Pokles TK
- d) Bradykardie

216. Obvyklým nálezem EEG u deliria je

- a) beta aktivita
- b) fokální hrotová aktivita
- c) zmožnění theta aktivity a desynchronizace**
- d) aktivita hrot-vlna

217. K patickému afektu nepatří

- a) rychlý nástup
- b) následná desorientace
- c) následná amnézie
- d) kvantitativní porucha vědomí**

218. Mezi mentální retardace způsobené poruchou metabolismu lipidů nepatří

- a) Gaucherova choroba
- b) Tay-Sachsova choroba
- c) Fenylketonurie**
- d) Niemann-Pickova choroba

219. Mezi nootropní farmaka náleží:

- a) meskalin
- b) fluoxetin
- c) piracetam**
- d) neplatí nic z uvedeného

220. Demence Alzheimerova typu (DAT) s pozdním začátkem je charakterizovaná přítomností

- a) Afektivní lability
- b) Konfabulací**
- c) Hypochondrických bludů
- d) Hyperaktivity

221. Přímým průkazem závislosti na alkoholu je

- a) Cirhóza jater
- b) Příznaky odvykacího stavu**
- c) Konfabulace
- d) Chorobná žárlivost

222. Pro léčbu poruch chování v dětském věku jsou užívána nejvíce:

- a) antipsychotika, především risperidon**
- b) stimulancia
- c) antidepresiva

d) k léčbě této poruchy farmaka nepoužíváme

223. Berneovou transakční analýzou se rozumí

- a) Analýza chování dětí, rodičů a dospělých
- b) Analýza komunikace mezi lidmi ze strany já-dítě-rodíč-dospělý**
- c) Analýza konfliktní situace mezi dětmi a rodiči
- d) Změny v reakcích na zátěž u dětí a dospělých

224. Rodinné prostředí a výchovné styly se nejvíce podílejí na vzniku

- a) neurotických obtíží**
- b) specifických vývojových poruch školních dovedností
- c) infantilního autismu
- d) Rettova syndromu

225. Patická rozespalost je charakterizována

- a) divokými sny
- b) kvantitativní poruchou vědomí
- c) nočními děsy
- d) kvalitativní poruchou vědomí**

226. Při konstatování snížené přičetnosti je využíváno především ustanovení

- a) § 26 trestního zákona
- b) § 27 trestního zákona**
- c) § 12 trestního řádu
- d) § 32 trestního řádu
- e) žádná odpověď není správná

227. Alzheimerova demence má klasickou EEG patologii.

- a) difúzně distribuovanou ve všech svodech**
- b) disperzní nález s ložiskem v jednom svodu, v ostatních nález normální
- c) má klasické epileptické EEG grafoelementy

228. Mezi základní příznaky manické epizody patří

- a) Logoroe
- b) Povznesená nálada
- c) Zvýšené psychomotorické tempo
- d) Platí vše uvedené**

229. Blokáda adrenergních alfa 1 receptorů nezpůsobuje:

- a) reflexní tachykardií s hypertenzí**
- b) poruchy srdečního AV vedení
- c) poruchy erekce
- d) zvýšení chuti k jídlu

230. Hypertermie v průběhu maligního neuroleptického syndromu dosahuje nejméně:

- a) 38 °C**

b) 40 °C

c) 41 °C

d) neplatí nic z uvedeného

231. Diagnózu progresivní paralýzy jednoznačně potvrdí přítomnost

- a) Demence
- b) Pozitivních reakcí na syfilis v krvi
- c) Atrofie mozku ověřené CT nálezem
- d) Pozitivního likvorologického nálezu**

232. U pacienta, který trpí bipolární afektivní poruchou je riziko unipolární deprese pro příbuzné 1. stupně:

- a) 20 - 26%**
- b) 1 - 3%
- c) 10 - 12%
- d) 30 - 36%

233. Apresexie je porucha

- a) paměti
- b) vyšších citů
- c) sexuálního pudu
- d) emotivity
- e) pozornosti**

234. Citová deprivace v útlém dětství způsobuje

- a) emoční poruchy
- b) poruchy vývoje osobnosti
- c) nic z uvedeného
- d) platí vše uvedené**

235. Pro deliriózní stav je typické

- a) ranní pesimum nálady
- b) blud kontrolovanosti
- c) expansivní nálada
- d) dezorientace**
- e) intrapsychické halucinace

236. Pro parafrenní formu schizofrenie jsou typické

- a) Tělové halucinace**
- b) Transformace osobnosti
- c) Porucha intelektu
- d) Depresivní nálada

237. Časná forma demence Alzheimerova typu (DAT) začíná nejpozději před dosažením věku

- a) 50 let
- b) 55 let

c) 60 let

d) 65 let

238. Coming out je termín označující

a) proces rozpoznání atypické sexuální orientace

b) první setkání deviantních jedinců

c) homosexuální debut

d) heterosexuální debut

239. K symptomům anorexia nervosa purgativní formy nepatří

a) Úmyslné navozování zvracení

b) Zneužívání diuretik a laxativ

c) Zneužívání dietních prostředků

d) Pouhá restrikce množství potravy

e) Neúměrné cvičení, i při ohrožení zdravotního stavu

240. Vtíravý strach se silným emočním nábojem se nazývá

a) fobie

b) blud

c) komplex

d) raptus

241. Imperativní halucinace znamenají

a) zveřejňování myšlenek

b) ovlivňování myšlenek na dálku

c) udílení příkazů

d) vkládání cizích myšlenek

e) platí vše uvedené

242. Věková regrese je

a) Postupné opožďování psychického vývoje

b) Snaha o vzbuzení dojmu mladšího věku-především u žen

c) Dianetické prožívání minulých životů

d) Subjekt je vhodnou technikou vrácen do dřívějšího období svého života

243. Které duševní poruchy nebo choroby mohou mít specifický nálezn na nativním EEG záznamu?

a) schizofrenní porucha

b) depresivní porucha úzkostná

c) depresivní porucha psychotické intenzity

d) epilepsie

244. Při dlouhodobém užívání opioidů dochází k

a) Poruchám myšlení

b) Poruchám libida

c) Poruchám chování

d) Platí vše uvedené

245. Převážně u dívek se vyskytuje

a) Kannerův syndrom

b) Rettův syndrom

c) školní fobie

d) dyslexie

246. Deliriózní stav se zpravidla nevyskytuje u

a) Pneumonie

b) Typhus exanthematicus

c) Difterie

d) Malárie

247. Mezi antidepresiva, která jsou léky volby u sexuálně aktivních pacientů s afektivní poruchou, patří

a) klomipramin

b) citalopram

c) fluoxetin

d) bupropion

e) vše z uvedeného

248. Když nemocný nehovoří, aniž jde o organickou poruchu řeči, jedná se o

a) afonii

b) afázii

c) mutismus

d) parafázii

249. Apaticko-abulický syndrom je poruchou především

a) myšlení

b) emotivity a vůle

c) vědomí

d) obživného pudu

250. Přesvědčení, že pacientovi někdo čte myšlenky, patří do okruhu

a) halucinací paměti

b) intrapsychických halucinací

c) obsedantního myšlení

d) neplatí nic z uvedeného

251. Somatizace je

a) somatické příznaky u duševní poruchy

b) konverze psychických problémů do somatických obtíží

c) psychické příznaky u somatické poruchy

d) platí vše uvedené

252. Myšlení inkohrentní je

- a) katatymní
- b) ulpívané
- c) nesouvislé**
- d) zabíhavé
- e) zmatené

253. Flexibilitas cerea je

- a) jednotvárné opakování týchž úkonů
- b) setrvávání v pasivně nastavené pozici**
- c) obřadné úkony
- d) neplatí nic z uvedeného

254. Krádeže jsou typické pro

- a) Mentální retardaci
- b) Disociální poruchu osobnosti**
- c) Epilepsii
- d) Abulii

255. Po sexuální strážce mají nejméně obtíží v sexuálním a partnerském životě pacienti

- a) s poruchami nálady**
- b) se schizofrenií
- c) s neurotickými obtížemi
- d) s poruchami příjmu potravy
- e) s demencí

256. Citová oploštělost je typická pro

- a) závislou poruchu osobnosti
- b) melancholický stupor
- c) manický stupor
- d) schizofrenii**
- e) neplatí nic z uvedeného

257. Bipolární afektivní porucha se častěji vyskytuje u osob s habitem

- a) Pyknickým**
- b) Astenickým
- c) Atletickým
- d) Dysplastickým

258. Alogenní myšlenky jsou součástí

- a) inkohrentního myšlení
- b) intrapsychických halucinací**
- c) zmateného myšlení
- d) platí vše uvedené

259. Neologismus je označení pro

- a) nově vzniklý blud

- b) neobvyklé spojení slov
- c) nově vytvořené slovo z psychotických motivací**
- d) intrapsychickou halucinaci

260. Acetylcholinesterázy jsou enzymy, které:

- a) syntetizují acetylcholin
- b) odbourávají acetylcholin**
- c) zvyšují zpětné vychytávání cholinu v neuronech
- d) snižují zpětné vychytávání cholinu v neuronech

261. Sexuální pud lze tlumit

- a) neuroleptiky
- b) antiandrogeny
- c) gestageny
- d) platí vše uvedené**
- e) neplatí nic z uvedeného

262. Odvykávací stav při závislosti na psychoaktivních látkách vzniká jako důsledek závislosti

- a) Psychické
- b) Somatické**
- c) Psychologické
- d) Platí vše uvedené

263. Mezi formy depresivní nálady nepatří nálada

- a) anxiózní
- b) rezonanční**
- c) apatická
- d) anhedonická

264. Diagnóza patického afektu v době páchání trestné činnosti má obvykle za následek vyslovení

- a) vymizení rozpoznávacích a ovládacích schopností**
- b) podstatného snížení rozpoznávacích a ovládacích schopností
- c) polehčující okolnosti
- d) neplatí nic z uvedeného

265. Při pohlavním styku nedosahuje orgasmu nikdy

- a) 5-10 % žen**
- b) 10-20 % žen
- c) 20-30 % žen
- d) 30-40 % žen
- e) 40-50 % žen

266. V případě, že se pachatel poprvé dopustí trestného činu ve stavu patické opilosti, hodnotíme jeho rozpoznávací a ovládací schopnosti většinou jako

- a) zachovalé
- b) snížené

c) vymizelé

d) podle hladiny alkoholu v krvi a dalších okolností

267. Pro cyklothymii je charakteristické

a) Emoční vyhaslost

b) Střídání nálad

c) Megalomanické bludy

d) Přechodné psychotické epizody

268. Amence, amentní stav je zastaralý název pro

a) mentální retardaci

b) demenci

c) kvalitativní poruchu vědomí

d) mráкотný stav

269. Postup léčby je třeba

a) Pacientovi vysvětlit a prokonzultovat

b) Přilížit s pacientem neprobírat

c) Neplatí nic z uvedeného

d) Platí vše uvedené

270. Paroxetin náleží mezi:

a) tricyklická antidepresiva

b) selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu

c) inhibitory monoaminoxidázy A typu

d) selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (antidepresiva 3. generace)

271. Autogenní trénink vypracoval

a) V. E. Frankl

b) C. G. Jung

c) J. Fischer

d) J. H. Schultz

272. Iluze je

a) porucha vědomě navozená

b) vjem bez reálného podnětu

c) porucha myšlení

d) zkreslený vjem reálné skutečnosti

273. Disociační porucha motoriky je typická pro

a) Reaktivní stavy

b) Epilepsii

c) Schizofrenii

d) Organické poruchy

274. Přesvědčení o vkládání a odnímání myšlenek patří mezi

a) poruchy osobnosti

b) poruchy jednání

c) intrapsychické halucinace

d) platí vše uvedené

275. Závěť je neplatná, když zůstavitel

a) byl zbaven způsobilosti k právním úkonům

b) v době jejího sestavování trpěl duševní poruchou

c) byl omezen ve způsobilosti k právním úkonům vzhledem k nakládání s majetkem

d) platí vše uvedené

276. Pro trvalou poruchu s bludy je typický výskyt

a) Halucinací

b) Formálních poruch myšlení

c) Bludů často navazujících na traumatizující zážitek

d) Platí vše uvedené

277. Mezi základní symptomy schizofrenie nepatří

a) Kvalitativní poruchy myšlení

b) Kvalitativní poruchy vědomí

c) Poruchy jednání

d) Přetrvávající halucinace

278. Mezi chronické komplikace alkoholismu nelze zařadit

a) Patickou ebrietu

b) Korsakovovu psychózu

c) Degradaci a deprivaci osobnosti

d) Wernickeovu encefalopatii

279. Katathymní myšlení je typické pro

a) katatonní schizofrenii

b) emoční útlum

c) myšlení zkreslené emocí

d) platí vše uvedené

280. Extrémní zátěžové situace v časném dětství mohou měnit zejména aktivitu dopaminergního a noradrenergního systému:

a) uvedené tvrzení je správné

b) uvedené tvrzení není správné

c) dochází k ovlivnění pouze systému dopaminergního

d) dochází k ovlivnění pouze systému noradrenergního

281. Zvýšené riziko onemocnění diabetem mellitem je vyšší po dlouhodobém podávání:

a) klozapinu a olanzapinu

b) chlorpromazinu a levopromazinu

c) haloperidolu

d) u žádného z uvedených farmak

282. K charakteristice schizoidní osobnosti nepatří

- a) **Důvěřivost**
- b) Snový svět
- c) Podezřavost
- d) Uzavřenost

283. Empatie je

- a) Klidný oční kontakt
- b) **Vcítění se**
- c) Terapeutická metoda
- d) Nic z uvedeného

284. Alternace osobnosti znamená

- a) životní zlom
- b) desintegraci osobnosti
- c) **střídání dvou i více identit**
- d) rozštěp osobnosti

285. Nejvýraznější protiúzkostný efekt z uvedených antidepresiv má:

- a) moclobemid
- b) bupropion
- c) fluoxetin
- d) **paroxetin**

286. Oční kontakt s pacientem

- a) Je důležitý v počáteční fázi rozhovoru
- b) Nemá bránit písemným poznámkám
- c) Je důležitější, než písemné poznámky
- d) **Platí vše uvedené**

287. Ředitelská nemoc (manager's disease) je v podstatě

- a) Posttraumatická stresová porucha
- b) Fobická úzkostná porucha
- c) **Neurastenie s psychosomatickou symptomatikou**
- d) Larvovaná deprese

288. Pasivní negativismus je

- a) strojové vykonávání příkazu
- b) psychomotorický útlum
- c) **nevyhovění výzvě**
- d) nepřirozené obřadní úkony

289. U odsouzeného sexuálního delikventa, kterému byla uložena ochranná léčba, lze provést kastraci

a) po projednání žádosti pachatele o tento zákrok v odborné komisi

- b) na příkaz soudu
- c) z rozhodnutí lékaře, provádějícího ochrannou léčbu
- d) nelze provést

290. Plasticita mozku (platí následující výrok):

- a) **plasticita mozku je zodpovědná za učení a je nejvýraznější během vývoje, je přítomna v menší míře po celý život**
- b) plasticita mozku je zodpovědná za učení a je nejvýraznější během vývoje, v menší míře se projevuje do 40 let věku
- c) plasticita mozku je zodpovědná za učení a je nejvýraznější během vývoje, v menší míře se projevuje do 50 let věku
- d) neplatí nic z uvedeného

291. K příznakům schizoidní osobnosti nepatří

- a) Nedostatek blízkých přátel
- b) Necitlivost pro společenské konvence
- c) Zjevná lhostejnost ke chvále a kritice
- d) **Zvýšená sexuální aktivita**

292. Mezi typické příznaky počínající Alzheimerovy demence s časným začátkem nepatří

- a) Fatické poruchy
- b) Depresivní nálada
- c) **Začátek po 65. roce**
- d) Neplatí nic z uvedeného

293. Mezi komplikace dlouhodobé léčby tricyklickými antidepresivy nepatří:

- a) sklon k tachykardii
- b) zácpa
- c) poruchy akomodace oka
- d) **tardivní dyskineze**

294. Heterogenní etiologie duševních poruch znamená že:

- a) **při různé genetické podmíněnosti existují stejné klinické obrazy duševní choroby**
- b) při stejné genetické podmíněnosti existují různé klinické obrazy
- c) nejedná se o genetickou podmíněnost
- d) nic z uvedeného není správné

295. Amnestická desorientace je typická pro syndrom

- a) apaticko-abulický
- b) **korsakovský**
- c) oneiroidní
- d) pseudoneurastenický

296. Nejlepší účinek profylaxe lithiem je možno očekávat u:

- a) rychlých cyklérů

- b) pacientů s bipolární afektivní poruchou
- c) pacientů s periodickou rekurentní depresí
- d) neplatí nic z uvedeného

297. Typické poruchy chování v dětském věku jsou

- a) toulky, lži, krádeže, záškoláctví
- b) enuréza, mutismus, balbuties
- c) úzkost, neklid, fobie
- d) sebepoškozování

298. Je-li jedinec trpící schizofrenií přesvědčen, že vidí ústy, jde o halucinaci

- a) intrapsychickou
- b) cenestetickou
- c) extrakampinní
- d) inadekvátní

299. U deliria tremens bývají nejčastější halucinace a iluze

- a) Zrakové
- b) Tělové
- c) Sluchové
- d) Intrapsychické

300. Kritériem nepřítomnosti pachatele jsou

- a) kvalita rozpoznávacích a ovládacích schopností pachatele v době páchaní trestné činnosti
- b) diagnóza duševní poruchy
- c) dostatečný intelekt
- d) platí vše uvedené

301. Při rodinné terapii – systemickém přístupu je nutné

- a) Léčit člena rodiny, který je nemocen
- b) Léčit člena rodiny, který má největší vliv na rozvoj choroby u člena rodiny
- c) Léčit postupně všechny členy rodiny
- d) Ovlivnit systém rodinných vazeb a vztahů společně s jejich vzájemnou komunikací

302. Přítomnost pouze jednoho X-chromozómu (tzv. X variant je u

- a) Fenylketonurie
- b) Klinefelterova syndromu
- c) Turnerova syndromu
- d) Mongolismu

303. Upustit od potrestání pachatele, když ochranné léčení lépe splní ochranu společnosti i nápravu pachatele, umožňuje

- a) § 26 trestního zákona
- b) § 27 trestního zákona
- c) § 47 trestního zákona
- d) § 172 trestního zákona

- e) žádná odpověď není správná

304. Racionalizace je

- a) Změna vedoucí k využití psychických možností organismu hospodárným způsobem
- b) Psychotherapeutický směr zabývající se rozvojem kognitivních schopností, nácvikem jednotlivých jeho složek
- c) Systém zdůvodnění, omluv a výmluv vycházející z potřeby potlačit negativní psychické děje
- d) Systém psychických dějů důležitých pro změnu motivace

305. Specifické vývojové poruchy školních dovedností jsou způsobeny

- a) mentální retardací
- b) vnějšími faktory školního prostředí
- c) zrakovými a sluchovými vadami
- d) ničím z uvedeného

306. Chronická žárlivost je typická pro

- a) Schizofrenii
- b) M. Alzheimer
- c) Chronický alkoholismus
- d) Psychotickou depresi

307. Během rozhovoru si psychiatr všímá

- a) Toho, co pacient říká
- b) Toho, co pacient říká a jak se při tom chová
- c) Vlastních pocitů
- d) Platí vše uvedené

308. Pro panickou poruchu je typické

- a) psychogenní příčina
- b) opakovaný výskyt
- c) ranní pesimum
- d) cyanóza rtů

309. Vyšší city jsou narušeny u

- a) demence
- b) některých specifických poruch osobnosti
- c) schizofrenie
- d) všeho uvedeného

310. Posttraumatická stresová porucha se vyvine od stresující události

- a) Ihned
- b) Jako opožděná reakce do 6 měsíců
- c) Po několika letech
- d) Platí vše uvedené

311. Mezi periodické depresivní poruchy patří deprese

- a) Psychogenní
- b) Organická
- c) Larvovaná**
- d) Symptomatická

312. Snížená schopnost dělat všední rozhodnutí bez poskytování rad a ujišťování druhými je projevem poruchy osobnosti

- a) emočně nestabilní
- b) schizoidní
- c) vyhýbavé
- d) závislé**

313. Hepatotoxicita se nejčastěji vyskytuje jako závažná komplikace léčby:

- a) klasickými antipsychotiky**
- b) tricyklickými antidepresivy
- c) revesibilními inhibitory monoaminoxidázy
- d) benzodiazepinovými anxiolytiky

314. Mezi nejčastěji se vyskytující nežádoucí účinky inhibitorů mozkových acetylcholinesteráz patří:

- a) gastrointestinální účinky – průjemy, nechutenství, nauzea, dyspepsie**
- b) Epileptické záchvaty
- c) Nežádoucí sedace
- d) Kožní projevy – exantémy, zarudnutí, fotosenzitivita

315. Amnestická dezorientace je projevem

- a) poruchy vědomí
- b) depersonalizace
- c) poruchy paměti**
- d) halucinatorního syndromu

316. Dělení psychoterapie na direktivní a nedirektivní je podle

- a) Životního zaměření pacienta
- b) Chování terapeuta**
- c) C. G. Junga
- d) Neplatí nic z uvedeného

317. Rozhovor je třeba

- a) Nechat volně plynout
- b) Vést bod po bodu
- c) Vše řečené přesně zaznamenat
- d) Neplatí nic z uvedeného**

318. Mezi nežádoucí účinky léčby benzodiazepiny nepatří:

- a) sedace
- b) amnestický syndrom
- c) potencie účinku alkoholu

d) kardiotoxicita

319. Kontrérní myšlenky mají ráz myšlení

- a) katatymního
- b) bludného
- c) zmateného
- d) vtíravého**

320. K příznakům změn osobnosti po katastrofické zkušenosti nepatří

- a) Zhoršení interpersonálních vztahů
- b) Zvýšená potřeba sociálních kontaktů**
- c) Nedůvěřivý postoj ke světu
- d) Pocity prázdnoty a beznaděje

321. Hypnoterapie se osvědčuje u

- a) Funkčních a organických poruch ústrojí trávicího, vyměšovacího, dechového atd.
- b) Psychogenních poruch hybnosti, smyslů a chování
- c) Poruch citového prožívání a nepříjemných tělesných pocitů
- d) Platí vše uvedené**

322. Autencitou rozumíme

- a) Opravdovost
- b) terapeut reaguje jako člen skupiny
- c) přirozená forma lidského setkání
- d) platí vše uvedené**

323. Od dětství do dospělosti lze zaznamenat v EEG následující změny:

- a) vzestup podílu alfa aktivity, ústup theta a delta aktivity**
- b) vzestup theta a beta aktivity na úkor alfa aktivity
- c) vzestup podílu theta aktivity a ústup alfa a beta aktivity
- d) neplatí nic z uvedeného

324. Tourettův syndrom je při léčbě antipsychotiky (zejména risperidonem) kompenzován:

- a) asi u 50% pacientů**
- b) asi u 70% pacientů
- c) asi u 10% pacientů
- d) neplatí nic z uvedeného

325. ADHD se vyskytuje:

- a) pouze u dětí předškolního věku
- b) v dětském, dorostovém a dospělém věku**
- c) pouze u dětí školního věku
- d) neplatí nic z uvedeného

326. K vaskulární demenci nepatří

- a) Binswangerova encefalopatie

b) Parkinsonova choroba

- c) Smíšená kortikální a subkortikální demence
- d) Multiinfarktová demence

327. Synaptické změny trvají:

- a) od několika milisekund až po několik měsíců**
- b) několik milisekund
- c) od několika milisekund po několik hodin
- d) neplatí nic z uvedeného

328. Paralysis progressiva juvenilis

- a) je častým projevem vrozené přijice**
- b) je důsledkem pohlavního zneužití
- c) vzniká při pohlavní promiskuitě
- d) je méně častým projevem vrozené přijice

329. Anxiolytika u dětí:

- a) používáme výjimečně
- b) zvyšují riziko zhoršení poruchy pozornosti s hyperaktivitou a impulzivitou (ADHD) a dětské agresivity
- c) anxiolytika jsou používána téměř výhradně jako antikonvulzivní léčba
- d) platí vše uvedené**

330. Grimasování je

- a) obřadné, nepřírozené úkony
- b) útlum pohybových reakcí
- c) bizarní mimika**
- d) napodobování vzoru

331. Grafospasmus se vyskytuje u

- a) Spánkové obrny
- b) Disociační poruchy**
- c) M. Huntington
- d) M. Alzheimer

332. Prefrontální kortex zprostředkuje následující funkce:

- a) pozornost a percepce
- b) časové integrace
- c) afekty a emoce
- d) platí vše uvedené**

333. Zmatené myšlení se vyskytuje při

- a) mentální retardaci
- b) demenci
- c) deliriu**
- d) schizofrenii

334. Při odvykacím stavu po odnětí některých psychoaktivních látek se vyskytnou

- a) Halucinace
- b) Obluzené vědomí
- c) Iluze
- d) Platí vše uvedené**

335. Závěry soudně znaleckého psychiatrického posudku jsou pro soud

- a) zavazující
- b) hodnotí se jako jeden z důkazů**
- c) mají pouze pomocný význam
- d) nemusí je brát do úvahy

336. EEG záznam je ve většině případů ovlivněn, změněn proti normálu po podání:

- a) antipsychotik
- b) benzodiazepinů, anxiolytik
- c) lithiových solí
- d) všech výše uvedených psychofarmak**

337. Mezi nežádoucí účinky zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) nepatří:

- a) zácpa**
- b) snížení sexuální apetence
- c) snížení chuti k jídlu
- d) možnost zhoršení gastroduodenální vředové choroby

338. Pro emotivitu u schizofrenie je typická nálada

- a) Depresivní
- b) Manická
- c) Euforická
- d) Oploštělá**

339. Moristan byl

- a) nositel duševní choroby
- b) zákon na ochranu společnosti před duševně chorými
- c) útulek pro duševně choré**
- d) medikamentózní prostředek pro léčbu duševní choroby

340. Psychoterapeutický proces je děj, který

- a) Vede ke změně vrozené genetické výbavy
- b) Umožní pacientovi vysvětlit jeho onemocnění
- c) Psychologickými prostředky dosáhne změnu v postoji k chorobě za pomoci terapeuta
- d) Je zaměřen na navození potřebných změn v myšlení, prožívání a chování pacienta a je řízen terapeutem**

341. Celoživotní prevalence předčasné ejakulace v populaci je přibližně

- a) 5%

- b) 15%
- c) 25%
- d) 35%**
- e) 45%

342. Bipolární afektivní porucha v dětství se léčí

- a) elektrokonvulzivní terapií
- b) psychofarmaky**
- c) separací od rodiny
- d) inzulínovou terapií

343. Sugestibilita je

- a) Léčebné působení hypnózou
- b) Schopnost jedince reagovat na sugesce**
- c) Schopnost jedince reagovat na příkazy
- d) Ovlivnitelnost pacienta v dané situaci

344. Pohlaví jedince má svou komponentu

- a) genetickou
- b) gonadální
- c) genitální
- d) centrální
- e) platí vše uvedené**

345. Pseudodemence se řadí k poruchám

- a) Disociačním**
- b) Afektivním
- c) Organickým
- d) Intelektu

346. Svépomocné skupiny sdružují jedince

- a) Se stejnou chorobou, využívající vzájemně osobních zkušeností, terapeut má funkci konzultanta**
- b) Se stejnou chorobou, využívající vzájemně osobních zkušeností, program řídí terapeut
- c) Se stejnou chorobou (somatickou či psychickým postižením), využívající svých osobních zkušeností, terapeuta nepotřebují
- d) Jedince, kteří zpracovávají zadanou problematiku či vytvářejí potřebné programy týkající se určité choroby

347. Osoby, u kterých je popsáno vyšší riziko vzniku poruchy příjmu potravy

- a) mají pocit malé vlastní hodnoty,
- b) hodnotí sebe samy očima druhých
- c) podléhají vnějším hodnotám
- d) platí vše uvedené**

348. Autorem díla „Výklad snů“ (1900) je

- a) K. Abrahám

- b) J. Bieber
- c) C. G. Jung
- d) S. Freud**

349. Skupinová dynamika je

- a) Rozvoj aktivit ve skupině pacientů, především s orientací na odstranění příznaků choroby
- b) Aktivní účast členů skupiny v diskusi o problému člena skupiny
- c) Využití terapeuticky významného vztahu mezi terapeutem a pacienty a zejména mezi pacienty samotnými ve skupinové psychoterapii**
- d) Aktivizace skupiny pacientů jinou nebo i více skupinami

350. Mezi následky dlouhodobého zneužívání toluenu nepatří

- a) Demence**
- b) Poruchy krvetvorby
- c) Poškození jaterních a ledvinových funkcí
- d) Chronické záněty sliznic dýchacích cest

351. K negativním příznakům schizofrenie patří

- a) Persekuční bludy
- b) Sluchové halucinace
- c) Neklid
- d) Alogie**

352. Mezi trvalé poruchy nálady nepatří

- a) Cyklotymie
- b) Dystymie
- c) Rekurentní depresivní porucha**
- d) Depresivní porucha osobnosti

353. V etiopatogenezi Alzheimerovy choroby se uplatňuje

- a) nepřítomnost tau-proteinu
- b) zvýšená přítomnost amyloidového prekurzorového proteinu
- c) přítomnost beta- a gama-sekretázy**
- d) nedostatek volných kyslíkových radikálů

354. K neorganickým poruchám spánku nepatří

- a) noční můry
- b) sopor**
- c) dyssomie
- d) noční děs
- e) somnambulismus

355. Pro psychogenní poruchy erekce je typické

- a) plíživý začátek obtíží
- b) věk nad 30 let
- c) nepřítomnost partnerských konfliktů

- d) stálost obtíží
- e) nic z uvedeného

356. Pachatel trpící chronickou paranoidní schizofrenií, který spáchá trestný čin pod vlivem svých bludů, je většinou

- a) shledán nepřičetným
- b) je mu uloženo ochranné léčení
- c) může být omezen ve způsobilosti k právním úkonům
- d) platí vše uvedené

357. Mezi tzv. scavengery (vychytávače, zametače) volných kyslíkových radikálů, používaných jako pomocné prostředky v léčbě demencí, nepatří:

- a) E – vitamin (alfa-tokoferol)
- b) quetiapin
- c) beta-karoten
- d) větší dávky C vitamínu

358. Přenos je termín pro označení přenesení

- a) Pozitivní či negativní nálady z pacienta na terapeuta
- b) Pozitivní či negativní nálady z terapeuta na pacienta
- c) Vývojově vytvořeného vztahu k významné osobě na terapeuta
- d) Pacientova postoje, způsobu prožívání a reagování dříve osvojeného do současného vztahu k terapeutovi

359. Alprazolam je:

- a) benzodiazepinové anxiolytikum
- b) selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu
- c) nebenzodiazepinové hypnotikum
- d) tricyklické antidepressivum

360. Když nevíme, jak pacientovi poradit,

- a) Neřekneme mu raději nic
- b) Poradíme mu něco, co nemůže uškodit
- c) Utěšíme ho
- d) Situaci vysvětlíme a rady se zatím zdržíme

361. Neschopnost poučit se ze zkušenosti (zvláště trestu) je typická pro poruchu osobnosti

- a) Histrionskou
- b) Disociální
- c) Anankastickou
- d) Schizoidní

362. Extractum ginkgo biloba se v psychiatrii používá v terapii:

- a) depresí
- b) úzkostných poruch
- c) delirií

d) lehkých poruch poznávacích funkcí

363. Pro demenci s Lewyho tělísky je typické

- a) Fluktuující průběh
- b) Paranoidně halucinatorní stavy
- c) Deliriozní stavy
- d) Platí vše uvedené

364. Rodinné prostředí má největší význam ve věku

- a) předškolním
- b) 6-10 let
- c) 18-25 let
- d) 1-18 let

365. Maligní neuroleptický syndrom vzniká při kombinaci:

- a) antipsychotik s antidepressivy
- b) antipsychotik s hypnotiky
- c) antipsychotik s lithiem

d) kombinace neuroleptik s jinými psychofarmaky není podmínkou rozvoje maligního neuroleptického syndromu

366. Pro histrionskou poruchu osobnosti není typické

- a) Trvalé vyhledávání vzrušení
- b) Nezájem o vlastní zevnějšek
- c) Mělká a labilní emotivita
- d) Přehnané projevy emocí

367. Zvýšená úzkostnost se vyskytuje u

- a) Anginy pectoris
- b) Tyreotoxikózy
- c) Hypoglykemie
- d) Platí vše uvedené

368. Sadismus a pedofilie

- a) vzájemně se vylučují
- b) mohou se vzácně nacházet u jednoho jedince
- c) při vzájemné kombinaci jsou výrazem psychotické poruchy
- d) neplatí nic z uvedeného

369. Pacient aktuálně hospitalizovaný v psychiatrickém zařízení má právo volit a být volen

- a) vždy
- b) pouze pakliže nebyl zbaven způsobilosti k právním úkonům
- c) závisí na posouzení ošetřujícího lékaře
- d) rozhoduje příslušná volební komise

370. Poruchy chování se diagnostikují u

- a) chování spojeného s manickým syndromem
- b) ojedinělých kriminálních činů
- c) disociačního chování trvajícího déle než 6 měsíců**
- d) horečnatých stavů

371. U pokročilé demence střední až vyšší intenzity doporučujeme

- a) omezení či zbavení způsobilosti k právním úkonům
- b) vymizení nebo podstatné snížení rozpoznávacích a ovládacích schopností při spáchání trestného činu
- c) ustanovení opatrovníka
- d) platí vše uvedené**

372. K Aspergerovu syndromu nepatří

- a) autismus
- b) stereotypní zájmy
- c) stereotypní činnosti
- d) významné zpoždění rozvoje řeči**

373. Imaginativní techniky v návaznosti na relaxaci pacienta pracují s jeho

- a) Prožíváním
- b) Meditací
- c) Představami**
- d) Sugescemi

374. Ereutofobii řadíme k poruchám

- a) sexuálního pudu
- b) emotivity**
- c) paměti
- d) osobnosti

375. Trestní odpovědnost počíná

- a) 10. rokem
- b) 12. rokem
- c) 15. rokem**
- d) 18. rokem

376. Korektivní zkušenost má odstranit

- a) Disociační chování
- b) Důsledky dřívějších nepřijemných zkušeností psychiatrických hospitalizací
- c) Důsledky dřívějších zkušeností, které se promítají do dalších mezilidských vztahů**
- d) Obranné mechanismy

377. Při disociační poruše

- a) není přítomen Babinského reflex**
- b) dochází k pokousání jazyka
- c) zornice nereagují na osvět

- d) hrozí zapadnutí jazyka

378. Schizofrenie v dětství se léčí

- a) některými neuroleptiky**
- b) pouze rodinnou psychoterapií
- c) přeřazením na jiný typ školy
- d) nic z uvedeného

379. Extractum ginkgo biloba má efekt na:

- a) neuronální metabolismus
- b) likvidaci volných kyslíkových radikálů
- c) shlukování trombocytů a tím tvorbu mozkových trombů
- d) vše z uvedeného**

380. Když je na rozhovor málo času, lékař má

- a) Raději od rozhovoru upustit
- b) Rychle vše probrat
- c) Probrat jen to nejdůležitější
- d) Na konci rozhovoru říci, co ještě zbývá na příště**

381. Při léčbě klozapinem a olanzapinem může dojít:

- a) ke zvýšení triglyceridů a cholesterolu v plazmě**
- b) ke zvýšení triglyceridů
- c) ke zvýšení cholesterolu
- d) neplatí nic z uvedeného

382. O záchvatech přejídání (binge eating) neplatí

- a) Je definován jako konzumace neobvyklého množství jídla
- b) V krátkém čase
- c) Je spojen s následným pocitem viny a studu
- d) Přejídání převážně málo kalorickou potravou**
- e) Pro stanovení diagnózy je důležitá jejich frekvence

383. Chorobná izolace od okolí patří do syndromu

- a) demence
- b) transformace osobnosti
- c) pseudodemence
- d) Aspergerova**

384. Pojem „rebound fenomen“ značí, že:

- a) s délkou léčby určitým preparátem přibývá nežádoucích efektů
- b) po náhlém vysazení látky se objeví všechny příznaky, které látka potlačuje**
- c) s délkou léčby určitým přípravkem ubývá nežádoucích efektů
- d) po náhlém vysazení látky se ve zvýšené míře objevují její nežádoucí příznaky

385. V léčbě bulimia nervosa se vedle nefarmakologických léčebných postupů uplatňují zejména:

- a) inhibitory zpětného vychytávání serotoninu
- b) fenothiaziny
- c) stimulantia
- d) žádná z uvedených skupin farmak

386. Halucinace je porucha

- a) myšlení
- b) vnímání**
- c) paměti
- d) pozornosti

387. Pojem paranoidní se vztahuje k poruchám

- a) vnímání
- b) vědomí
- c) myšlení**
- d) emotivity

388. Schizofrenie v dětství

- a) začíná často
- b) začíná asi v 5% onemocnění**
- c) začíná asi ve 40 % onemocnění
- d) není u dětí diagnostikována

389. Sexuální úchylky (parafilie) jsou

- a) častěji u mužů**
- b) častěji u žen
- c) stejně časté
- d) není možno přesně odpovědět
- e) existují transkulturní rozdíly

390. Projevem přenosového vztahu je

- a) Nekritický obdiv
- b) Vzдорovitost
- c) Nepřiměřená kritičnost
- d) Platí vše uvedené**

391. Mezi obvyklé příznaky simplexní schizofrenie nepatří

- a) Plíživý začátek
- b) Halucinace**
- c) Emoční otupělost
- d) Hypobulie

392. Při terapii funkčních sexuálních poruch nepoužíváme

- a) Behaviorální postupy
- b) Sugestivní a hypnoterapeutické praktiky
- c) Partnerskou léčbu

d) Meditativní techniky

393. Pro paranoidní schizofrenii je typický příznak

- a) Intrapsychické halucinace**
- b) Poruchy spánku
- c) Manická nálada
- d) Platí vše uvedené

394. Ganserův syndrom je projevem

- a) M. Alzheimer
- b) M. Pick
- c) Psychogenní psychózy**
- d) Psychotické deprese

395. Mezi epileptické grafoelementy (EEG projevy epilepsie) nepatří:

- a) komplexy hrot vlna
- b) mnohočetné hroty
- c) rolandický (mjú/μ) rytmus**

396. Mezi projevy neurastenického syndromu nepatří

- a) Labilita nálad
- b) Porucha pozornosti
- c) Somatické potíže
- d) Hypochondrické bludy**

397. Poruchy vědomí, vnímání a paměti jsou m.j. příznaky osobnosti

- a) Anankastické
- b) Astenické
- c) Explosivní
- d) Histrionské**

398. Poruchy erekce jsou nejčastější ve věku kolem

- a) 20 let
- b) 30 let
- c) 40 let
- d) 50 let
- e) 60 let**

399. Pro disociální poruchu osobnosti je typické

- a) Přítomnost disociačních projevů
- b) Nezáměr o city druhých osob**
- c) Zvýšená tolerance k frustraci
- d) Snížená úroveň intelektu

400. Pacient trpící epilepsií může mít nález:

- a) normální

- b) abnormní
- c) všechny uvedené možnosti**
- d) patologický

401. K demencím prionové etiologie nepatří demence při

- a) AIDS**
- b) Kuru
- c) Creutzfeldtově-Jakobově chorobě
- d) Bovinní spongiformní encefalopatii

402. Panická porucha vzniká následkem

- a) Prožití děsivé situace
- b) Bez přítomnosti zjevných provokujících momentů**
- c) Obav z budoucnosti
- d) Platí vše uvedené

403. Pro psychotickou depresivní náladu není typické

- a) neodklonitelnost
- b) večerní pesimismus
- c) nemotivovanost**
- d) ranní pesimismus

404. Terapeutickým vztahem je

- a) Přenos
- b) Vcítění a akceptování pacienta terapeutem
- c) Interakce terapeuta a pacienta
- d) Platí vše uvedené**

405. Jako psychická komplikace klimaktéria se vyskytuje

- a) Suicidální aktivita
- b) Klimakterická deprese
- c) Různá erotická dobrodružství
- d) Platí vše uvedené**

406. Skupinová psychoterapie užívá techniky

- a) analýzy biografie
- b) výkladu snů
- c) skupinové dynamiky
- d) platí vše uvedené**

407. Sebevražedné jednání v dospívání

- a) je vzácné
- b) je poměrně časté
- c) je druhou nejčastější příčinou smrti**
- d) se nedagnostikuje, protože pojem smrti je ještě nejasný

408. Bálintovský lékařský seminář má za cíl

- a) Odstranit komunikační šumy mezi lékaři
- b) Osvětlit vztahovou problematiku lékař-pacient**
- c) Psychoterapeuticky podpořit lékaře v rámci duševní hygieny
- d) Řešit psychické problémy lékaře

409. Virová etiologie byla prokázána u

- a) M. Huntingtoni
- b) M. Alzheimer
- c) M. Creutzfeldt-Jacob**
- d) Neurosyfilis

410. Hypnóza je stav

- a) sugescí změněného stavu vědomí**
- b) sugescí nezměněného stavu vědomí
- c) změna ve vnímání
- d) změna kvality myšlení

411. Zolpidem je:

- a) antipsychotikum
- b) antidepresivum
- c) inhibitor mozkových acetylcholinesteráz
- d) hypnotikum**

412. Mezi základní příznaky syndromu demence patří

- a) halucinace
- b) vrozený nedostatek intelektu
- c) porucha paměti**
- d) platí vše uvedené
- e) neplatí nic z uvedeného

413. Sugescie je proces

- a) Za kterého dochází k nekritickému přijetí myšlenky**
- b) Opakovaného vyslovení stejného slova
- c) Přijetí myšlenky s podmínkou zvýšení intenzity hlasu
- d) Přijetí myšlenky s podmínkou snížení intenzity hlasu

414. Mezi preventivní opatření vzniku poruch příjmu potravy patří

- a) Orientace na zlepšení výkonu
- b) Zlepšení sebevědomí a sebehodnocení**
- c) Orientace na hodnoty týkající se zevnějšku
- d) Zlepšení znalostí o zdravých dietách

415. O nedobrovolném léčení rozhodne s konečnou platností

- a) ošetřující lékař
- b) ředitel zdravotnického zařízení

c) vedoucí zdravotního odboru příslušného místního úřadu

d) příslušný soud

416. V případě, že se pachatel poprvé dopustí trestného činu ve stavu komplikované opilosti, hodnotíme jeho rozpoznávací a ovládací schopnosti většinou jako

a) zachovalé

b) snížené

c) vymizelé

d) podle hladiny alkoholu v krvi a dalších okolností

417. Fyziologické reakce na sexuální podněty lze rozdělit do fází

a) excitace, plateau, uvolnění

b) plateau, orgastické

c) orgastické, uvolnění

d) excitace, plateau, orgastické a uvolnění

e) neplatí nic z uvedeného

418. Mechanismus účinku lithia je :

a) komplexní (např. inhibuje inositolmonofosfatázu, GSK-3 beta, uptake a uvolňování glutamátu)

b) serotoninergní

c) serotoninergní, noradrenergní, dopaminergní.

d) neplatí nic z uvedeného

419. Blokáda 52 serotoninových receptorů:

a) upravuje spánek

b) upravuje náladu

c) snižuje agresivitu

d) platí vše uvedené

420. Neurotické poruchy nemají mezi svými příznaky

a) poruchy nálady

b) poruchy spánku

c) vtíravé myšlenky

d) hypochondrické bludy

421. Z benzodiazepinových přípravků se používá jako hypnotikum:

a) midazolam

b) diazepam

c) clonazepam

d) bromazepam

422. Humanistická psychoterapie využívá psychoterapeutického vztahu, který je

a) Autentický

b) Manipulativní

c) Vždy pozitivní

d) Selektivní

423. U Alzheimerovy choroby dochází k

a) Tvorbě patologické alfa-sekretázy

b) Degeneraci tau-proteinu

c) Zvýšení acetylcholinergní transmise

d) Platí vše uvedené

424. Karbamazepin je užíván při léčbě:

a) epilepsie

b) neuralgie trigeminu

c) manie

d) ve všech uvedených případech

425. U chlapců se projevuje častěji než u dívek

a) infantilní autismus

b) hyperkinetický syndrom

c) enuréza

d) vše uvedené

426. Spánková opilost znamená

a) ebrietu s následným spánkem

b) somnolenci při spánkové deprivaci

c) nadměrnou spavost

d) chorobnou rozespalost ve smyslu mráкотného stavu

e) nadměrnou spavost při alkoholové závislosti

427. Vtíravé myšlenky pacient vnímá jako

a) projev sníženého intelektu

b) nesmyslné

c) telepatické ovlivňování

d) příjemné rozptýlení

428. Separační úzkostná porucha v dětství se projevuje

a) dysgrafií

b) lhavostí

c) tiky

d) odmítáním školní docházky

429. Mezi fáze rozvoje patologického hráčství nepatří fáze

a) Výher

b) Prohrávání

c) Kritičnosti

d) Zoufalství

430. Schizofrenie v dětství

a) má stejnou prognózu jako v dospělosti

b) má horší prognózu než v dospělosti

- c) je nevléčitelná
- d) má dlouhé období remise

431. Pacientovi se představit

- a) Je zdvořilé
- b) Vzbuzuje důvěru
- c) Sděluje pacientovi, že ho bereme jako rovnocenného partnera
- d) Platí vše uvedené**

432. Z hlediska páchání trestné činnosti je společensky nejnebezpečnější a nejrozšířenější drogou

- a) alkohol**
- b) marihuana
- c) kokain
- d) pervitin
- e) heroin

433. Disociační porucha je charakterizovaná

- a) Organickým poškozením CNS
- b) Psychogenním původem**
- c) Disociační poruchou osobnosti
- d) Neplatí nic z uvedeného

434. Automutilace může být projevem

- a) libidinózního jednání
- b) touhy po sebetřýznění
- c) schizofrenie
- d) platí vše uvedené**

435. Mezi inhibitory mozkových acetylcholinesteráz nepatří:

- a) rivastigmin
- b) piracetam**
- c) donepezil
- d) galantamin

436. Mezi poruchy vnímání patří

- a) fotomy**
- b) paramnézie
- c) dezorientace
- d) hypoprosexie
- e) agrypnie

437. Ulpívavé myšlení se vyznačuje

- a) neschopností odtrhnout se od tématu**
- b) zmateností
- c) paralogiemi

d) opakováním slov i větších celků

438. Za základ pudové síly považuje pud sexuální a pud destruktivní

- a) E. Fromm
- b) C. G. Jung
- c) S. Freud**
- d) H. J. Eysenk

439. Pro Korsakovský syndrom jsou typické

- a) sluchové halucinace
- b) konfabulace**
- c) paranoidní myšlení
- d) depresivní nálada

440. Asertivita je

- a) Ztráta vazkosti
- b) Sebezničení
- c) Sebeuposazení**
- d) Sebepoznání

441. Příbuzným nemocných jedinců trpících bludy se má poradit, aby

- a) bludy vymlouvali
- b) s bludy souhlasili
- c) k nim zaujímalí indiferentní postoj**
- d) je v bludech utvrzovali

442. Podmínkou úspěšné léčby není

- a) motivace ke změně jídelního režimu
- b) normalizace hmotnosti
- c) farmakoterapie**
- d) terapeutický vztah
- e) podporující rodinné zázemí

443. Kyselina valproová může způsobovat následující nežádoucí účinky:

- a) nauseu
- b) sedaci
- c) jemný třes rukou
- d) vše uvedené**

444. Prenatální sexuální vývoj je ovlivňován faktory především z oblasti

- a) biologické**
- b) psychosociální
- c) endokrinní
- d) genetické
- e) vše z uvedeného

445. Příznaky extrapyramidového syndromu jsou nejnižší při léčbě:

- a) klozapinem
- b) haloperidolem
- c) chlorpromazinem
- d) perfenazinem

446. Pro vaskulární demenci proti demenci Alzheimerova typu (DAT) svědčí

- a) Plynulá progresse
- b) **Akutní začátek**
- c) Rozpad osobnosti
- d) Expansivní nálada

447. Pacientka stará 35 let, vdaná, středoškolačka, u které proběhly 2 epizody deprese trvající několik týdnů a léčené antidepresivy, se začíná nepřiměřeně chovat. Málo spí, v noci vaří nebo uklízí, ale nic nedodělá. Začíná nadměrně mluvit, na ulici oslovuje cizí lidi a navazuje s nimi kontakty. Opakovaně odešla z práce s tím, že si musí něco vyřídit, již se ten den nevrátila. Nadměrně nakupuje, především zbytečné věci. Nejpravděpodobnější diagnóza je:

- a) Počínající hebefrenní (dezintegrovaná) schizofrenie.
- b) **Manická epizoda bipolární afektivní poruchy**
- c) Hraniční porucha osobnosti.
- d) Závislost na alkoholu.

448. Dystymie označuje náladu převážně

- a) Rezonantní
- b) **Depresivní**
- c) Úzkostnou
- d) Zlobnou

449. Sexuální dysfunkce jsou podmíněny

- a) partnerskými problémy
- b) výlučně psychogenními vlivy
- c) výlučně biologickými vlivy
- d) **biopsychosociálně**
- e) poruchou cévního zásobení genitálu

450. Častým nežádoucím účinkem risperidonu je:

- a) zvýšení hmotnosti
- b) zvýšení prolaktinemie
- c) **oba uvedené nežádoucí účinky**
- d) žádný z uvedených nežádoucích účinků

451. Akoasmata jsou

- a) mikromanické bludy
- b) **elementární sluchové halucinace**
- c) taktilní halucinace
- d) stereotypní motorické projevy

452. Poměr výskytu Anorexia nervosa u žen a u mužů je

- a) 5 : 6
- b) 6 : 5
- c) **10 : 1**
- d) neliší se podle pohlaví

453. Obsedantně kompulzivní porucha je charakterizována

- a) Přechodnými poruchami vědomí
- b) Antagonistickými halucinacemi
- c) **Myšlenkovou pochybovačností a nerozhodností**
- d) Emoční oploštělostí

454. Nebezpečí lithiové intoxikace se zvyšuje při:

- a) zánětu HCD s teplotami
- b) u stavů po infekční hepatitidě
- c) u stavů po úrazech v CNS
- d) **u poruch trávicího ústrojí spojených s průjmy a zvracení**

455. Záliba v tajemných náznacích a sklon k bájivé lhavosti patří do obrazu specifické poruchy osobnosti

- a) Emočně nestabilní
- b) **Histrionské**
- c) Schizoidní
- d) Anankastické

456. Pickova choroba je charakterizovaná

- a) Začátkem v 5.-6. deceniu
- b) Atrofií frontotemporální kůry
- c) Přítomností euforie
- d) **Platí vše uvedené**

457. Ganserův syndrom se nejčastěji vyskytuje u

- a) Hospitalismu
- b) Depresivních stavů
- c) **U vězňů před odsouzením**
- d) V době výkonu trestu

458. Neuroleptický maligní syndrom se nevyznačuje:

- a) hypertermií
- b) deliriem
- c) **bradykardií**
- d) extrapyramidovými příznaky

459. Depresivní syndrom v dětství se často projevuje

- a) halucinacemi

- b) dyslexií
- c) útek z domova
- d) bolestmi břicha, poruchami soustředění a neukázněností**

460. Pud je charakterizován

- a) chybním cíle
- b) zkratkovým jednáním
- c) emočním doprovodem**
- d) neplatí nic z uvedeného

461. EEG je kontraindikováno:

- a) v bezvědomí.
- b) při mozkových nádorech
- c) po elektroléčbě (ECT)
- d) není kontraindikováno**

462. Inhibitory monoaminoxidázy A typu se nekombinují s:

- a) kyselinou acetylsalicylovou
- b) tricyklickými antidepresivy**
- c) nesteroidními antirevmatiky
- d) antipsychotiky 2. generace

463. Behaviorální terapie se prvotně zaměřuje na

- a) Úpravu sociálního prostředí
- b) Vypracování náhledu
- c) Odstranění symptomů**
- d) Výklad symboliky

464. Jedinec trpící středně těžkou mentální retardací nepřekračuje mentální úroveň dítěte

- a) ročního
- b) tříletého
- c) šestiletého**
- d) devítiletého

465. K disociačním poruchám patří

- a) Stav posedlosti**
- b) Transformace osobnosti
- c) Disociační porucha osobnosti
- d) Primární blud

466. Psychiatrické posouzení intoxikovaného pachatele trestného činu závisí na

- a) stupni intoxikace
- b) stupni závislosti
- c) na psychopatologických motivech v době páchaní trestné činnosti
- d) platí vše uvedené**

467. Odpořem rozumíme

- a) Obranu pacienta před poznáním nepříjemných a nepřijatelných skutečností v oblasti nevědomí
- b) Způsob chování, prožívání a myšlení, jímž se pacient brání terapii
- c) Důsledek vzájemného vztahu s terapeutem, jako je např. zklamání z nesplněných očekávání
- d) Platí vše uvedené**

468. Mezi megalomanické bludy lze zařadit blud

- a) žárlivecký
- b) erotomanický**
- c) autoakuzanční
- d) negační

469. Iluze již viděného („deja vu“) se v případě organického původu nejspíše vyskytnou u

- a) deficitu vitaminů skupiny B
- b) tumoru parietálního laloku
- c) tumoru temporálního laloku**
- d) Korsakovského syndromu

470. Fobie je charakterizována

- a) konkrétním strachem
- b) zachovanou kritičností
- c) vtíravostí a nutkavostí
- d) platí vše uvedené**

471. U dětí s poruchou pozornosti s hyperaktivitou a impulzivitou (ADHD) jsou poruchy spánku, které je třeba léčit:

- a) jsou relativně časté
- b) mohou být způsobeny také medikací
- c) platí obě výše uvedené možnosti**
- d) nevyskytují

472. Neúčelně zvýšenou činnost nazýváme

- a) hyperbulie
- b) agitovanost**
- c) raptus
- d) automatismus

473. U deliria je myšlení

- a) nevýpravné
- b) autistické
- c) zmatené**
- d) ulpívavé

474. Pro definici bludu neplatí

- a) nevyvratnost
- b) neodpovídání realitě

c) inkohrentní myšlení

d) ovlivňování chování nemocného

475. K obecným charakteristikám specifické poruchy osobnosti patří

a) Zvýšená asertivita

b) Disharmonie jednotlivých psychických funkcí

c) Občasná psychotická dekompenzace

d) Sklon k sebeobviňování

476. Psychoterapie je léčebná metoda využívána

a) Pouze při léčbě neuróz

b) Pouze při léčbě závislosti

c) Všude tam, kde se (prokazatelně) na vzniku a vývoji poruchy podílejí psychogenní činitelé

d) U všech psychiatrických poruch

477. Rozhovor je nejlépe uvést frází

a) „tak povídejte“

b) „řekněte mi, co vás trápí“

c) „pojďte si promluvit“

d) „teď si vás vyslechnu“

478. Psychologické vyšetření užívá Rorschachova protokolu při

a) stanovení deteriorace intelektu

b) komplexním vyšetření osobnosti včetně intelektu

c) vyšetření paměťových funkcí

d) posuzování způsobilosti řídit motorové vozidlo

479. Muž starý 75 let, vysokoškolsky vzdělaný, důchodce, s dobrým rodinným zázemím. Je dlouhodobě léčen pro hypertenzi. Vždy si velmi dobře pamatoval. Poslední 3 týdny je výrazný úbytek zájmů a aktivity. Tvrdí, že ztratil paměť, že je naprosto hloupý. Horší výkonnost má po ránu, brzy se probouzí. Přestal jej bavit život. Objektivně je dobře orientovaný osobou, místem i časem. Nejpravděpodobnější diagnóza je:

a) Vaskulární demence s náhlým začátkem

b) Depresivní porucha

c) Abusus alkoholu

d) Abusus benzodiazepinů

480. Falopletyzmografie je diagnostická metoda vyšetřující především

a) sexuální reaktivitu

b) preferenci sexuálního objektu

c) preferenci sexuální aktivity

d) platí vše uvedené

481. Podpůrný rozhovor je

a) Využití a akcent na negativních složkách osobnosti pacienta

b) Využití a akcent na pozitivních složkách osobnosti pacienta (jeho podpora)

c) Veden s cílem shromáždit všechny úspěchy za určité časové období a desenzibilizovat tak pacienta vůči úzkosti

d) Vytvořit atmosféru, ve které ostatní pacienti poskytnou potřebnému pacientovi pozitivní zpětnou vazbu

482. Indukovaná porucha s bludy je charakterizovaná

a) Sdílením stejného bludu více osobami, které spolu žijí

b) Přítomností různých psychotických poruch u dvou osob, které spolu žijí

c) Komunikováním se sluchovými halucinacemi

d) Přítomností různých psychotických poruch v pokrevním příbuzenstvu

483. Při podezření na maligní neuroleptický syndrom není nutné provést vyšetření:

a) kreatinfosfokinázy

b) myoglobulinémie

c) CT hlavy a mozku

d) urey a kreatininu

484. Echopraxie je

a) nevyhověná výzvě

b) opakování viděných cizích pohybů a gest

c) jednotvárné opakování týchž pohybů

d) strojové opakování příkazu

485. Bizarní jednání schizofreniků se nazývá

a) kataplexie

b) stupor

c) manýrování

d) flexibilitas cerea

486. Hyperbulie znamená

a) hyperkinezi

b) zvýšenou volní aktivitu

c) agitovanost

d) zvýšený příjem potravy

487. Trazodon výrazně zlepšuje u depresivních pacientů:

a) chuť k jídlu

b) koncentraci pozornosti

c) hypotenzi

d) poruchy spánku

488. K rozpadu osobnosti dochází u

a) neurotických poruch

b) bipolární afektivní poruchy

c) Alzheimerovy choroby

d) specifické poruchy osobnosti

489. Pohlavní styky s osobou opačného pohlaví jsou u nás podle zákona dovoleny

- a) od 15 let
- b) od 18 let
- c) od 21 let
- d) zákonná hranice není stanovena

490. Průměrná délka neléčené manické epizody u BAP je

- a) 2 týdny
- b) 1 měsíc
- c) 3 měsíce
- d) 6 měsíců

491. K charakteristice temperamentu patří

- a) životní tempo
- b) celkový způsob reaktivity
- c) prožívání emocí
- d) platí vše uvedené

492. Limbický systém je tvořen prstencem mozkové tkáně, který v sagitální rovině obtáčí:

- a) corpus callosum
- b) parietální neokortex a frontální neokortex
- c) occipitální a temporální neokortex
- d) platí všechny uvedené možnosti

493. Úzkost je charakterizovaná

- a) poruchou emotivity
- b) nekonkrétností
- c) nemotivovaností
- d) platí vše uvedené

494. Pojem deteriorace intelektu znamená v psychologii

- a) úbytek intelektových výkonů v průběhu života
- b) nerozvinutí intelektu u mentální retardace
- c) synonymum pro demenci
- d) synonymum pro mentální subnormu

495. S iluzemi se nejčastěji setkáváme u

- a) autistického myšlení
- b) disociačních poruch
- c) autismu
- d) deliria

496. Zolpidem zlepšuje především:

- a) časně ranní probouzení
- b) usínání

c) parasomnické projevy vázané na REM spánek

d) somnambulismus

497. Genetický podíl na vzniku onemocnění znamená

- a) že rodiče se cítí více provinilí za onemocnění svých dětí
- b) že onemocnění nelze předejít
- c) že lze z genetického vyšetření predikovat vznik onemocnění
- d) že je nutné hledat protektivní faktory předcházející vzniku onemocnění

498. Muž starý 21 let, student vysoké školy, vždy uzavřený, samotářský, ale velmi dobře studující, se začal chovat neobvyklým způsobem. Přestal docházet na stáže a na přednášky. Ještě více se začal stranit přítomnosti svých spolustudentů. Opakovaně je obvinil z toho, že mu dělají naschvály, po několika týdnech se u něj objevilo přesvědčení, že je odposloucháván. V noci slyšel hlasy, které jej zesměšňovaly. Přiveden otcem k psychiatrovi, v ordinaci odmítal hovořit. Pravděpodobná diagnóza je:

- a) Histrionská porucha osobnosti.
- b) Zneužívání pervitinu.
- c) Paranoidní schizofrenie
- d) Porucha přízpůsobení

499. Je-li nemocný přesvědčen o svém mimořádném původu, jde o blud

- a) inventorní
- b) originární
- c) erotomanický
- d) enormity

500. Zákony v naší zemi dovolují vzájemně dobrovolné a bezplatné homosexuální styky od věku

- a) 15 let
- b) 18 let
- c) 21 let
- d) zákonná hranice není stanovena

501. K přetrvávající změně osobnosti může dojít po

- a) Prodělané těžké duševní chorobě
- b) Katastrofickém prožitku
- c) Nadměrné stresové události
- d) Platí vše uvedené

502. Při balintovské skupině se rozvíjí

- a) Kognitivní schopnosti
- b) Vhodná komunikace
- c) Reakce lékaře
- d) Vztah lékař-pacient

503. Mezi symptomy schizofrenie nepatří

- a) Poruchy aktivity

- b) Desorganizace myšlení
- c) Zkreslení skutečnosti
- d) Deficit intelektu**

504. Když se dostáváme do časové tísně,

- a) Dáme to pacientovi najevo
- b) Rozhovor ukončíme
- c) Pacientovi situaci vysvětlíme
- d) Shrneme, co jsme již probrali, a ostatní odkážeme na příště**

505. K organicky podmíněným poruchám osobnosti bez známek demence nepatří změna

- a) Emotivity
- b) Intelektu**
- c) Sexuálního chování
- d) Sociálního chování

506. Clomethiazol se užívá:

- a) v léčbě schizofrenie
- b) v léčbě deprese
- c) v léčbě nespavosti
- d) v léčbě deliria tremens**

507. K rozvoji odvykacího stavu u rozvinuté závislosti na heroinu dochází od užití poslední dávky za

- a) 4-6 hodin**
- b) 8-10 hodin
- c) 10 a více hodin
- d) neplatí nic z uvedeného

508. Prognostický význam emočních poruch v dětství je:

- a) u většiny jedinců se už v dospělosti nevyskytují**
- b) většina jedinců onemocní schizofrenií
- c) většina jedinců vykazuje asociální chování
- d) většina jedinců trpí poruchami paměti a pozornosti

509. Hlavním příznakem symptomatických psychóz je porucha

- a) Emotivity
- b) Vědomí**
- c) Intelektu
- d) Vnímání

510. Mezi fobické úzkostné poruchy nepatří

- a) Sociální fobie
- b) Obsedantně kompulzivní porucha**
- c) Agorafobie
- d) Platí vše uvedené

511. Mezi zakladatele české sexuologie patří

- a) F. Pečírka
- b) J. Hynie
- c) H. Bondy
- d) všichni uvedení**
- e) nikdo z uvedených

512. Příčiny vzniku poruch příjmu potravy jsou chápány jako multifaktoriální. Především hrají roli faktory

- a) Genetické
- b) Sociální
- c) Osobnostní
- d) Rodinné výchovy
- e) Platí vše uvedené**

513. Abreakce

- a) Pacienta psychotherapeutickým postupem zbavíme tenze
- b) Při znovuprožití frustrující situace za řízených podmínek dochází k úlevě**
- c) Psychotherapeutický proces je orientován na omezení a zpomalení pacientových reakcí
- d) Neplatí nic z uvedeného

514. V literatuře se uvádí, že genetické faktory se podílejí na vzniku poruch příjmu potravy

- a) V 50 a více procentech**
- b) V 10 procentech
- c) Pouze u malé podskupiny pacientů
- d) Pouze u bulimie nervosa

515. Přesmykávání a vynechávání slabik je typické pro

- a) Manický syndrom
- b) M. Alzheimer
- c) Progresivní paralýzu**
- d) Hebefrenii

516. Do spektra poruch příjmu potravy nepatří

- a) Anorexia nervosa
- b) Bulimia nervosa
- c) Psychogenní přejídání
- d) Pica**
- e) Noční přejídání

517. Intrapsychický konflikt jako psychoanalytický pojem je

- a) Partnerský konflikt bez možnosti verbalizace a tím i ventilace za účelem abreakce
- b) Nárůst vnitřní tenze s přerůstajícím vlivem na emoční sféru
- c) Rozpor mezi hodnotami reprezentovanými ego a superego
- d) Spor mezi pudovými silami v systému nevědomí a předpokládanými, obecně přijatými vědomými normami**

518. Dynamická psychoterapie

- a) Je zaměřena na reorganizaci osobnosti
- b) Věnuje pozornost interpersonálním vztahům a aktuálním konfliktovým situacím
- c) Pacientovi pomáhá v porozumění dynamickým vztahům mezi jeho minulými zážitky a současnými postoji
- d) Je zaměřena na vše uvedené**

519. Bludné přesvědčení, že pro velké provinění nebude pacientovi dovoleno zemřít, se nazývá blud

- a) originární
- b) negační
- c) eternity (ahasverismus)**
- d) inventorní

520. Pro trvalou poruchu s bludy je typické

- a) Přechod do demence
- b) Přechodné stavy poruch vědomí
- c) Tělové halucinace
- d) Systemizované bludy**

521. S příznakem pseudologia phantastica se nejčastěji setkáme u specifické poruchy osobnosti

- a) Schizoidní
- b) Paranoidní
- c) Histrionské**
- d) Závislé

522. Tzv. šoková léčba byla v minulosti prováděna

- a) insulinem
- b) atropinem
- c) kardiazolem
- d) platí vše uvedené**

523. Obsedantně kompulzivní léčba se v dětském věku léčí:

- a) pouze psychoterapií
- b) pouze farmakoterapií
- c) oběma metodami dle charakteru a závažnosti poruchy**
- d) obsedantně kompulzivní porucha u dětí se upravuje spontánně

524. Korektivní zkušenost je

- a) Terapeutické využití opakovaných konfliktních situací k prolomení bludného kruhu interakcí mezi pacientem a okolím**
- b) Systém účinného trestu, který vede ke změně chování
- c) Možnost terapeutického využití osobních zkušeností terapeuta z kritických situací v běžném životě
- d) Terapeutické využití teoretických znalostí o zvládnání konfliktních situací v interakci pacienta a okolí

525. Pro stanovení většiny psychiatrických diagnóz rozhovor s pacientem

- a) Je zcela nedůležitý
- b) Má okrajový význam
- c) Je nejdůležitější**
- d) Poskytuje doplňující údaje

526. Latentní kriminalita bývá nejvyšší u

- a) sadistů
- b) pedofilů
- c) exhibicionistů**
- d) patologických sexuálních agresorů
- e) nekrofilů

527. Pro lehkou intoxikaci opioidy je typické

- a) Úzkost
- b) Euforie**
- c) Mydriáza
- d) Sopor

528. Mezi kvantitativní poruchy vědomí řadíme

- a) sopor**
- b) obnubilaci
- c) patickou opilost
- d) patickou rozespalost

529. Moria je

- a) rozlada u vaskulární demence
- b) porucha paměti
- c) plané vtípkování u prefrontálního syndromu**
- d) projev emoční lability
- e) prudká afektivní reakce

530. EEG je v dětské a dorostové psychiatrii:

- a) významné z hlediska výzkumu a diagnostiky, např. u hyperkinetické poruchy**
- b) nemají v dětské a dorostové psychiatrii žádný klinický a teoretický význam
- c) mají význam teoretický, ale nikoliv klinický
- d) neplatí nic z uvedeného

531. Sexuální chování lidí stimuluje především centrální systém

- a) dopaminergní**
- b) serotoninergní
- c) opioidní
- d) gabaergní
- e) platí vše z uvedeného

532. Nejúspěšnější farmakoterapii bulimické symptomatiky představují

- a) Benzodiazepiny

b) SSRI

- c) Neuroleptika
- d) Thymoprofylaktika

533. Na léčbě poruch příjmu potravy se mohou podílet

- a) Psychiatr a psycholog
- b) Nutriční poradce a svépomocné organizace
- c) Praktický lékař
- d) Gynekolog
- e) Všichni uvedení**

534. Pro psychotickou depresi je typický blud

- a) Žárlivecký
- b) Hypochondrický**
- c) Persekuční
- d) Originární

535. Sexuální delikty jsou nejčastěji páčány muži ve věku

- a) do 18 let
- b) do 35 let**
- c) nad 40 let
- d) není zjištěna predilekční věková kategorie

536. Komplexní léčba poruch příjmu potravy zahrnuje

- a) Pravidelný jídelní režim
- b) Akceptaci cílové hmotnosti a její dosažení
- c) Psychoterapii zaměřenou na osobnostní a vztahové problémy
- d) Prevenci relapsu
- e) Platí vše uvedené**

537. Pro akutní a přechodné psychotické poruchy je typické

- a) Emoční stlup
- b) Zárazy myšlení
- c) Měnlivost symptomů**
- d) Autismus

538. Rodinná psychoterapie je

- a) Zařazení rodiny do terapeutické komunity
- b) Postupná individuální terapie členů rodiny
- c) Společná terapie členů rodinného kolektivu**
- d) Zařazení členů rodiny do běžné skupinové psychoterapie

539. Erektce je jedinec mužského pohlaví schopen

- a) od začátku svého života**
- b) po 5. roce života
- c) po 10. roce života

d) po začátku puberty

e) neplatí nic z uvedeného

540. Melatonin má účinek:

- a) antipsychotický
- b) psychostimulační
- c) halucinogenní

d) hypnotický

541. Transpersonální psychoterapie pracuje se změnou

- a) Vědomí, při kterém se vytvářejí imaginativní obrazy
- b) Vědomí působením psychedelických látek, při kterém se uvolní nevědomé, běžně nepřístupné psychické obsahy
- c) Transpersonálních vztahů

d) Vědomí a uvolněním nevědomých a běžně nepřístupných psychických obsahů

542. Kegelovy cviky se používají v léčbě

- a) sexuálních delikventů
- b) poruch erekce
- c) předčasné ejakulace
- d) poruch orgasmu žen**
- e) platí vše z uvedeného

543. Anorexia nervosa vzniká nejčastěji

- a) U dětí v 6 letech
- b) U adolescentů ve 13-15 letech**
- c) U žen po porodu
- d) U žen po třicítce
- e) U dospělých žen po 20. roce života

544. Bulimie se vyskytuje u

- a) Katatonie
- b) Demence**
- c) Apaticko-abulického syndromu
- d) Neplatí nic z uvedeného

545. Empatie je podstatná u psychoterapie zaměřené na

- a) Komunikační terapii
- b) Osobu**
- c) Psychogymnastické metody
- d) Hlubině odkrývající

546. K normálním projevům dítěte předškolního věku nepatří

- a) zoofobie**
- b) ostražitost před neznámými lidmi
- c) občasné nerozpoznání barev

d) občasné nerozpoznání pravé a levé ruky

547. Myšlení zpomalené nazýváme

- a) nevýpravné
- b) bradypsychické**
- c) inkoherentní
- d) roztříštěné
- e) slovní salát

548. Inteligenční kvocient vyjadřuje poměr mezi

- a) inteligencí a intelektem
- b) pamětí a intelektem
- c) mentálním a kalendářním věkem**
- d) intelektem a osobností

549. Kastrální komplex je

- a) Stadium vývoje sexuality s obavou o ztrátu penisu u muže a závisť penisu u ženy**
- b) Systém opatření k odstranění pohlavní zralosti
- c) Psychické důsledky po neúspěšném sexuálním styku při nátlaku partnerky
- d) Označení pro všechny příznaky impotence jak u muže tak u ženy

550. Stimulancia jsou lékem volby v léčbě:

- a) mentální anorexie
- b) narkolepsie a hyperkinetické poruchy (ADHD)**
- c) schizofrenie
- d) neplatí nic z uvedeného

551. Mezi tzv. funkční psychózy nepatří

- a) Schizofrenie
- b) Delirium**
- c) Bipolární afektivní porucha
- d) Schizoafektivní porucha

552. Blokáda muskarinových receptorů nezpůsobuje:

- a) zvýšené pocení**
- b) ztížené močení
- c) retrogradní ejakulaci
- d) poruchy paměti

553. Mezi tricyklická antidepressiva (thymoleptika 1.generace) nepatří:

- a) amitriptylin
- b) fluoxetin**
- c) nortriptylin
- d) dosulepin

554. U hyperkinetických dětí jsou vhodné tyto výchovné přístupy

a) zákaz mimoškolních aktivit

- b) výuka rozdělená do kratších časových úseků**
- c) větší počet domácích úkolů
- d) méně častý kontakt s vrstevníky

555. Pro vigilambulantní mráкотný stav je typická přítomnost

- a) stuporu
- b) strnulého pohledu**
- c) agitovanosti
- d) manické nálady

556. Pro diagnózu paranoidní poruchy osobnosti je typické

- a) Sklon ke zdůrazňování důležitosti vlastní osoby**
- b) Emoční chlad
- c) Vytváření systému bludů
- d) Sklon k depersonalisacím

557. Mezi pervazivní onemocnění v dětství nepatří

- a) Aspergerův syndrom
- b) Kannerův autismus
- c) syndrom Gilles de la Tourettův**
- d) Rettův syndrom

558. Mezi nutkavé projevy nepatří

- a) fobie
- b) panická úzkost**
- c) obsese
- d) kompulze

559. Larvovaná deprese je označení pro

- a) Nepoznanou depresi
- b) Periodickou mánii bez zjevných depresivních fází
- c) Fázicky se vyskytující somatické potíže bez zjevné deprese**
- d) Disimulaci deprese

560. Do syndromu demence nepatří

- a) kvalitativní porucha vědomí**
- b) získaná porucha paměti
- c) porucha emotivity
- d) ulpívavé myšlení

561. Vaginismus může být s jistotou diagnostikován na základě

- a) anamnestického vyšetření
- b) informace od sexuálního partnera
- c) neúspěchu farmakologické léčby
- d) gynekologického vyšetření**

e) platí vše z uvedeného

562. K reversibilním demencím patří demence při

- a) Pickově chorobě
- b) neurosyfilis**
- c) Alzheimerově chorobě
- d) Chorea Huntingtoni

563. K metabolickým demencím nepatří demence při

- a) Uremii
- b) Wilsonově chorobě
- c) Kuru**
- d) Jaterní encefalopatii

564. Konfabulace je příznakem

- a) bájně lhavosti
- b) simulace
- c) kvalitativní poruchy vědomí
- d) schizofrenie
- e) organické poruchy paměti**

565. Inhibitory mozkových acetylcholinesteráz jsou užívány k terapii:

- a) Deprese
- b) Alzheimerovy choroby**
- c) Úzkosti
- d) Nespavosti

566. Mezi duševní poruchy, které nejčastěji vedou k vyslovení nepřičetnosti pachatele trestného činu, patří diagnóza

- a) neurotické poruchy
- b) poruchy osobnosti
- c) poruch intelektu
- d) schizofrenie**

567. Mezi expanzivní bludy nepatří blud

- a) inventorní
- b) ruinační**
- c) originární
- d) erotomanický
- e) extrapotenční

568. U úzkostných poruch a poruch přizpůsobení jsou nejčastější EEG nálezy:

- a) beta záznamy s převahou beta aktivity**
- b) s ložiskem pomalých vln temporálně vlevo
- c) normální nálezy
- d) s epileptickými grafoelementy

569. Mezi benzodiazepinová anxiolytika nepatří:

- a) buspiron**
- b) oxazepam
- c) bromazepam
- d) clonazepam

570. Pro simplexní schizofrenii je typický příznak

- a) Zkratkové jednání
- b) Porucha vědomí
- c) Ztráta zájmů**
- d) Agitovanost

571. Raptus je jednání

- a) obřadné
- b) strojové vykonání příkazu
- c) bouřlivé, často agresivní**
- d) účelové
- e) platí vše uvedené

572. Patický afekt je charakterizován poruchou

- a) emotivity
- b) vědomí
- c) paměti
- d) platí vše uvedené**
- e) neplatí nic z uvedeného

573. Pro hebefrenii je typické

- a) Klackovité chování**
- b) Sluchové halucinace
- c) Mikromanické bludy
- d) Autismus

574. Obsese jsou myšlenky

- a) dominantní
- b) kontrétní
- c) vtíravé**
- d) platí vše uvedené
- e) neplatí nic z uvedeného

575. Hluboká mentální retardace je diagnosticky rozpoznatelná již (nebo až) ve věku

- a) kojeneckém**
- b) předškolním
- c) školním
- d) puberty

576. U rekurentní deprese je nálada zpravidla nejhorší

- a) **Ráno**
- b) Večer
- c) Bez ohledu na denní dobu
- d) Platí vše uvedené

577. Hydroxizin je:

- a) antidepresivum
- b) benzodiazepinové anxiolytikum
- c) **nebenzodiazepinové anxiolytikum**
- d) psychostimulans

578. Pro schizofrenní myšlení je typické

- a) **paralogie**
- b) konfabulace
- c) zabíhavost do ztráty determinující tendence
- d) ulpívavost

579. Strach z výšky se nazývá

- a) agorafobie
- b) mysophobia
- c) **hypsofobie**
- d) keraunofobie

580. Osoba starší 18 let může být zbavena způsobilosti k právním úkonům, jestliže

- a) si to přeje její rodiče
- b) **trpí závažnou duševní poruchou, která není přechodná**
- c) trpí jakoukoliv duševní chorobou či poruchou
- d) nemůže být zbavena
- e) e) žádná odpověď není správná

581. Sex-specifická diferenciací sexuálních center v mozku probíhá v lidské ontogenezi

- a) v prvním trimestru nitroděložního vývoje
- b) **ve druhém trimestru**
- c) ve třetím trimestru
- d) v prvních měsících po narození
- e) platí vše z uvedeného

582. Specifická porucha počítání se vyskytuje často u

- a) mentální retardace
- b) výchovně zanedbaných dětí
- c) **dětí s hyperkinetickým syndromem**
- d) dětí s poruchami sluchu

583. Terapeutická komunita využívá

- a) Mnohočetné interakční vztahy v hierarchické struktuře

b) Mnohočetné interakční vztahy a komunikační modely bez hierarchické struktury v demokratické atmosféře, s programem orientovaným na společný cíl

- c) Mnohočetné interakční vztahy a komunikační modely bez hierarchické struktury v demokratické atmosféře a při prosazování osobních cílových hodnot
- d) Terapeutické postupy pro větší počet lidí, a tak dosahuje racionálního využití personálu

584. Pro taktilní halucinózu jsou typické halucinace

- a) Cenestopatické
- b) Intrapsychické
- c) **Hmatové**
- d) Chuťové

585. Plané filosofování je nejtypičtější pro schizofrenii

- a) Simplexní
- b) **Hebefrenní**
- c) Paranoidní
- d) Katatonní

586. Pro syndrom deliria je typické

- a) suicidální úmysly
- b) **dezorientace**
- c) megalomaničké bludy
- d) intrapsychické halucinace

587. Pro specifickou poruchu osobnosti je typické

- a) Periodický průběh
- b) Trvalá anxieta
- c) **Manifestace v období puberty**
- d) Sklon k sebezporování

588. Apersonalizací se myslí

- a) transformace osobnosti
- b) alternace osobnosti
- c) rozpad osobnosti
- d) **připojení další osobnosti ke své vlastní**

589. Blud vychází z

- a) nesprávných logických operací
- b) **nesprávné premise**
- c) nedostatečného intelektu
- d) odlišného světového názoru

590. Psychiatr je odborníkem

- a) V diagnostice
- b) V diagnostice a léčbě
- c) V diagnostice, léčbě a prevenci

d) Ve všech zmíněných oblastech

591. Náhlé, bouřlivé a často agresivní jednání doprovázené silným afektem se nazývá

- a) agitovanost
- b) raptus**
- c) impuls
- d) zkratkové jednání

592. Bupropion je užíván zejména u:

- a) depresí provázených útlumem**
- b) depresí provázených úzkostí
- c) psychotických depresí
- d) generalizované úzkostné poruchy

593. V rozhovoru je třeba

- a) Zeptat se jasně na konkrétní věci
- b) Položit otevřené otázky
- c) Požádat o příklady
- d) Platí vše uvedené**

594. Intrapsychické halucinace jsou typické pro schizofrenii

- a) Hebefrenní
- b) Simplexní
- c) Katatonní
- d) Paranoidní**

595. V dětské a dorostové psychiatrii se psychofarmaka

- a) používají: výjimečně
- b) u pacientů se schizofrenií, poruchou pozornosti s hyperaktivitou a impulzivitou (ADHD), depresí a u dalších poruch**
- c) jen u dětí léčených na ADHD a tikovou poruchu
- d) u žádných z uvedených poruch

596. Mezi obvyklé příznaky periodické deprese nepatří

- a) pedanterie**
- b) ztráta chuti k jídlu
- c) ranní pesimum nálady
- d) ztráta zájmů

597. Poruchy příjmu potravy se mohou vyskytovat i u profesionálů, kteří se léčbou zabývají

- a) Pro pacienty to je výhoda
- b) Situaci je nutno posuzovat individuálně**
- c) Pro pacienty to může představovat problém
- d) Léčbu to nijak neovlivňuje

598. Neverbální komunikaci zejména využívá

- a) Psychodrama
- b) Psychogymnastika**
- c) Hraní rolí
- d) Autogenní trénink

599. Blokád histaminových receptorů nezpůsobuje:

- a) anxiózně-depresivní syndrom**
- b) hypnosedativní působení
- c) hypotenzi
- d) zvýšení hmotnosti

600. Autoskopická halucinace se nejvíce blíží

- a) depersonalizaci**
- b) halucinaci intrapsychické
- c) halucinaci inadekvátní
- d) iluzi zrakové

601. U syndromu nočního přejídání (NES) neplatí, že

- a) Nemusí vždy být hmotnostní přírůstek,
- b) Většinou je konzumace o 500 kalorií vyšší u než u normálních jedinců.
- c) Touto chorobou trpí 5% populace, především ženy**
- d) Je u obézních až v 10% a u masivně obézních až ve 27%.

602. Mezi fenothiaziny nepatří:

- a) promazin
- b) haloperidol**
- c) chlorpromazin
- d) neplatí nic z uvedeného

603. Pro přechodnou psychotickou poruchu je typické

- a) Akutní začátek
- b) Přítomnost halucinací a bludů
- c) Afektivní labilita
- d) Platí vše uvedené**

604. Omega (benzodiazepinové) receptorové subjednotky jsou součástí receptorů:

- a) dopaminových typu D1
- b) receptorů kyseliny gama-aminomáselné typu GABAA**
- c) receptorů excitačních aminokyselin typu AMPA
- d) serotonergních receptorů typu 5-HT1A

605. Mezi projekční psychologické nástroje patří

- a) Ravenův test
- b) Rorschachův protokol**
- c) Wechslerův test
- d) Minimental State Examination

e) Neplatí nic z uvedeného

606. Do rizikové populace pro vznik poruch příjmu potravy nepatří

- a) Vrcholoví sportovci a sportovkyně
- b) Baletky a tanečnice
- c) Modelky a herečky
- d) Učitelky a učitelé**

607. Zakladatelem nedirektivního psychotherapeutického rozhovoru je

- a) C. R. Rogers**
- b) M. Balint
- c) V. Schreiber
- d) E. Erikson

608. U periodické deprese se poruchy spánku projevují

- a) Inverzí spánku
- b) Povrchním spánkem
- c) Špatným usínáním
- d) Brzkým ranním probouzením**

609. Přenosová neuróza je podle Freuda

- a) Psychotherapeutická nemoc z povolání
- b) Běžná součást psychotherapeutické terapie**
- c) Therapeutická chyba
- d) Symptomatická obsedantně kompulzivní porucha

610. Prostřednictvím kterého neurotransmiterového systému působí benzodiazepinová anxiolytika?

- a) serotonergního
- b) noradrenergního
- c) GABAergního (systému kyseliny gama-aminomáselné)**
- d) Dopaminergního

611. V případě, že se pachatel dopustí trestného činu ve stavu prosté opilosti mírné intenzity, hodnotíme jeho rozpoznávací a ovládací schopnosti většinou jako

- a) zachovalé**
- b) snížené
- c) vymizelé
- d) podle hladiny alkoholu v krvi a dalších okolností

612. Psychosomatický přístup

- a) Pracuje s psychosociálními vlivy na somatické choroby a pojímá pacienta jako celek**
- b) Vychází ze zjištění, že somatická choroba může ovlivnit psychiku
- c) Vychází ze zjištění, že psychická choroba způsobuje somatické onemocnění
- d) Je vhodný především pro ambulantní léčbu

613. Mezi specifické vývojové poruchy nepatří

- a) dyslexie
- b) dyskalkulie
- c) syndrom neobratného dítěte
- d) fobie**

614. Pro simplexní schizofrenii je typický příznak

- a) Autismus**
- b) Halucinace
- c) Persekuční bludy
- d) Klackovité chování

615. Mezi projevy simulace patří

- a) Ganserův syndrom
- b) pseudologia phantastica
- c) konfabulace
- d) neplatí nic z uvedeného**

616. Je-li život jedince usměrňován určitou myšlenkou, jde o

- a) dominující představu
- b) ovládací myšlenku**
- c) komplex
- d) neplatí nic z uvedeného

617. U chlapce, který vysloví přání být dívkou budeme diferenciatně diagnosticky zvažovat přítomnost

- a) poruchy pohlavní identity
- b) poruchu přízpůsobení
- c) afektivní poruchy
- d) psychotické poruchy
- e) vše z uvedeného**

618. Manický jedinec může být nebezpečný sobě i svému okolí

- a) zvýšeným utrácením peněz
- b) vulgárním a hlučným chováním
- c) navazováním nevhodných partnerských vztahů
- d) platí vše uvedené**

619. Antimanický účinek nevykazuje:

- a) karbamazepin
- b) lithium karbonát
- c) lithium citrát
- d) methylfenidát**

620. Psychogenní paranoidní psychózu řadíme do širší kategorie

- a) Schizofrenie
- b) Reaktivních stavů**

- c) Symptomatických psychóz
- d) Afektivních poruch

621. Normální osobnost zaniká při

- a) kontrénních myšlenkách
- b) antagonistických halucinací
- c) obnubilaci**
- d) platí vše uvedené

622. V etiopatogenezi ADHD hraje hlavní roli systém:

- a) dopaminergní
- b) serotoninergní
- c) cholinergní
- d) dopaminergní a noradrenergní**

623. Aktivní negativismus znamená

- a) agresivní chování vůči vyšetřujícímu
- b) odmítání vyhovět pokynu
- c) děláním pravého opaku, než se na pacientovi žádá**
- d) platí vše uvedené

624. Mezi bludy mikromanické nepatří blud

- a) ruinační
- b) enormity**
- c) hypochondrický
- d) eternity

625. Pro potschizofrenní defekt není typické

- a) Autismus
- b) Emoční labilita**
- c) Citová otupělost
- d) Hypobulie

626. Mezi odvykáací stavy u alkoholismu patří

- a) Reziduální poruchy
- b) Alkoholová halucinóza
- c) Patická opilost
- d) Delirium tremens**

627. Mezi nejčastější příčiny úmrtí u anorexia nervosa nepatří

- a) Kardiovaskulární komplikace
- b) Sebevražda
- c) Důsledky metabolického rozvratu při malnutrici a zvracení
- d) Nádorová onemocnění**

628. K hyperkinetickému syndromu nepatří

- a) porucha pozornosti
- b) pocity méněcennosti
- c) manický syndrom**
- d) desihibice v sociálních vztazích

629. K manickému syndromu patří

- a) inkoherence
- b) pseudoinkoherence**
- c) autismus
- d) hypersomnie

630. Průměrná denní dávka citalopramu v léčbě depresivních poruch je:

- a) 2,0 - 4,0 mg
- b) 10 - 60 mg**
- c) 200 - 400 mg
- d) 0,2 - 0,4 mg

631. K příznakům akutní intoxikace halucinogeny patří

- a) Depersonalisace
- b) Afektivní labilita
- c) Snížená koncentrace
- d) Platí vše uvedené**

632. Je-li jedinec nemocný schizofrenií přesvědčen, že vidí i mimo rozsah svého zorného pole, jde o halucinaci

- a) asociovanou
- b) reflektorickou
- c) inadekvátní
- d) extrakampinní**

633. Sigmund Freud se věnoval především studiu

- a) schizofrenie
- b) maniodepresivity
- c) demence
- d) hysterie**

634. Puntičkářství a perfekcionismus je známkou osobnosti

- a) Histrionské
- b) Anankastické**
- c) Schizoidní
- d) Paranoidní

635. Kverulatořní blud patří nejspíše do obrazu

- a) Psychotické deprese
- b) Psychotické manie
- c) Trvalé poruchy s bludy**

d) Přejídné psychotické poruchy

636. Do syndromu závislosti nepatří

- a) Postupné zanedbávání jiných potěšení a zájmů
- b) Zvýšená tolerance
- c) Snížená tolerance**
- d) Potíže v kontrole užívání látky

637. Přesvědčení o vlastní společenské méněcennosti je typické pro specifickou poruchu

- a) Emočně nestabilní
- b) Paranoidní
- c) Závislou**
- d) Schizoidní

638. Oidipovský komplex je

- a) Závistivý postoj k druhému pohlaví
- b) Nevědomý erotický vztah k rodiči opačného pohlaví**
- c) Strach z nefunkčnosti pohlavního orgánu
- d) Divadelní hra

639. Humanistická psychoterapie je založena

- a) Soustavném rozšiřování péče o člověka
- b) Respektování a prosazování potřeb jednotlivce
- c) Pomoci člověku v životní tísni
- d) Respektování lidské individuality a možnosti osobnostního růstu a rozvoje**

640. Fetální alkoholový syndrom se vyvine u plodu ženy se závislostí na alkoholu, která

- a) Pokračuje v době těhotenství v požívání alkoholu**
- b) Během těhotenství abstinuje
- c) otěhotněla pod vlivem alkoholu
- d) Platí vše uvedené

641. Pro schizotypní poruchu nesvědčí

- a) Emoční labilita**
- b) Občasné psychotické epizody
- c) Podezíravost
- d) Podivínské chování

642. Mezi typ vedení psychotherapeutické skupiny nepatří skupina

- a) Interakční
- b) Tematická
- c) Seberegulační**
- d) Biografická

643. Způsobitost občanů k právním úkonům se zabývá

- a) trestní zákon

b) trestní řád

c) občanský zákoník

d) jiný zákon

e) žádná odpověď není správná

644. Autogenní trénink je

- a) Stupeň jogínské meditace
- b) Soubor autosugestivních relaxačních cvičení**
- c) Technika tvarové psychoterapie
- d) Příprava na následující psychoterapii

645. Afektivní labilita znamená

- a) projev bezradnosti
- b) psychickou nevyváženost u normálního jedince
- c) vegetativní labilitu se silným afektivním doprovodem
- d) náhlé střídání afektů různého druhu**

646. Když pacient hovoří volně a spontánně

- a) Je třeba co nejdříve ho přerušit.
- b) Nechat ho tak hovořit stále
- c) Nechat ho vymluvit se a pak rozhovor ukončit
- d) Z toho, co říká, najít podstatné a to pak rozvinout**

647. Pro patickou ebrietu je typické

- a) Agresivní chování
- b) Kvalitativní porucha vědomí
- c) Nezávislost na množství požitého alkoholu
- d) Platí vše uvedené**

648. Obnubilace patří do klinického obrazu

- a) Schizofrenie
- b) Manického syndromu
- c) Ebrietas simplex
- d) Symptomatické psychózy**

649. Náplní sexuologie je léčebně preventivní péče o

- a) pacienty se sexuálními dysfunkcemi, muže i ženy
- b) pacienty se sexuálními úchytkami, muže i ženy
- c) pachatele sexuálními deliktů
- d) pacienty s poruchami plodnosti s důrazem na andrologii a na celý infertilní pár
- e) platí vše z uvedeného**

650. Pro disociační poruchu není typické

- a) Psychogenní amnézie
- b) Spastický pláč**
- c) Pocit nedostatku vzduchu

d) Poruchy motoriky a citlivosti

651. Pro diagnózu reziduální schizofrenie se vyžaduje přítomnost

a) Negativních příznaků schizofrenie

b) Demence

c) Intrapsychických halucinací

d) Úplné remise

652. Schizofrenie bývá spojena s tělesnou konstitucí

a) Pyknickou

b) Atletickou

c) Dysplastickou

d) Leptosomní

653. K diagnóze restriktivní formy anorexie nepatří

a) Zvýšená sebekontrola a perfekcionismus

b) Restrikce jídla

c) Zvracení

d) Výrazná malnutrice

654. Léčbu sestupnými dávkami methadonu lze použít při odvykání:

a) benzodiazepinů

b) opiátů

c) psychostimulancií

d) halucinogenů

655. Posthypnotická sugescie spočívá v

a) Doplnující instrukci pro pacienta po skončení hypnózy

b) Sugesci zadané v hypnóze s nástupem účinku po skončení hypnózy

c) Doplnující sugesci po skončení hypnózy

d) Neplatí nic z uvedeného

656. Psychoterapeutická krizová intervence je

a) Časově a věcně omezený léčebný zásah

b) Předchází nekontrolovanému rozvinutí psychických poruch a nemocí

c) Pomoc člověku, který nevládá situaci

d) Platí vše uvedené

657. Empatie je

a) Korektivní zkušenost

b) Posun v motivaci

c) Vliv nových situací v životě pacienta

d) Schopnost vcítění a porozumění

658. Syndrom nočního přejídání (NES) nezahrnuje

a) Ranní záchvatovité přejídání (binge eating)

b) Pozdně odpolední a večerní hyperfagii

c) Nejméně 50% denního příjmu energie je přijímáno po posledním večerním jídle

d) Potíže s usínáním

e) Jedení při probuzení, pacienti znovu bez menší dávky jídla neusnou

659. K neverbálním technikám patří

a) Arteterapie

b) Muzikoterapie

c) Pantomína

d) Platí vše uvedené

660. Hypomnézie znamená

a) ostrůvkovitou amnézii

b) formu deprese

c) povšechné snížení paměťových funkcí

d) retrogradní amnézii

e) iluze paměti

661. Typickým příznakem Rettova syndromu je

a) somnilokvie

b) ztráta funkčních pohybů ruky

c) urychlený rozvoj řeči

d) nadměrná spavost

662. Benzodiazepinová anxiolytika mají mimo jiné účinek:"

a) psychostimulační

b) halucinogenní

c) antipsychotický

d) antikonvulzivní

663. Alkoholismus v dospívání je způsoben

a) závadami ve výchovném prostředí

b) hereditární zátěží

c) nezralou strukturou osobnosti

d) vším uvedeným

664. Postnatální sexuální vývoj je ovlivňován faktory především z oblasti

a) biologické

b) psychosociální

c) endokrinní

d) genetické

e) vše z uvedeného

665. Specifická fobie androfobie označuje strach z

a) Lidí

b) Žen

- c) Mužů
- d) Zvířat

666. Psychoterapeut provádí psychoterapii na základě

- a) Bohaté odborné a životní zkušenosti
- b) Osvojení teoretických a etických zásad
- c) Systematického, dlouhodobého a kontrolovaného výcviku**
- d) Bezúhonnosti a psychologického přístupu

667. Cílem supervize je

- a) Komplexní zachycení průběhu terapie
- b) Odborná pomoc psychoterapeutovi**
- c) Poznání „slepých míst“ v práci psychoterapeuta
- d) Kritika psychoterapeuta

668. Pozice terapeut pacient „face to face“ se používá u

- a) Psychoanalýzy
- b) Psychogymnastiky
- c) Rogerovské psychoterapie**
- d) Arteterapie

669. Závažný nežádoucí účinek clomethiazolu je:

- a) útlum dechového centra**
- b) útlum krvetvorby
- c) vyvolání autoimunní reakce
- d) útlum sekrece inzulinu

670. Pro schizofrenní impuls je typické

- a) porucha vědomí
- b) zachovalá vzpomínka**
- c) ztráta vzpomínky
- d) zlostná nálada